

# ホジキンリンパ腫

## ABVd療法

4週毎 最大8回

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
ドキシソルビシン	ADM	ドキシソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15
ブレオマイシン	BLM	ブレオ	9 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15
ビンブラスチン	VLB	エクザール	6 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15
ダカルバジン	DTIC	ダカルバジン	250 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15

※)15mgまで

Day1, 15  
Day2・3,  
16・17  
Day2～4,  
16～18

イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服

イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

デカドロン8mg内服

\* デカドロンは、使用しない場合がある。

Day1,15

生食 100ml / ルートキープ(外来のみ)

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P /15min

生理食塩液50ml + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V /15min

ドキシソルビシン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml  
/ 緩徐に5分かけて静注

ブレオマイシン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml  
/ 緩徐に5分かけて静注

ビンブラスチン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml  
/ 緩徐に静注

ダカルバジン ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min

\* ダカルバジンは、点滴ボトルとラインを遮光