

非ホジキンリンパ腫

CHASER療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
リツキシマブ		リツキサン	375 mg/m ²	Day1
デキサメタゾン	DEX	デキサート	33(40) mg/body	Day2~4
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサン	1200 mg/m ²	Day2
シタラビン	Ara-C	キロサイド	2000 mg/m ²	Day3,4
エトポシド	VP-16	エトポシド	100 mg/m ²	Day2~4

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml
/ 30min 過去にinfusion reaction出現した場合投与

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ※

※ リツキシマブ600mg以下の場合には生理食塩液500mlを使用

Day2

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P+デキサート(6.6mg/2ml) 5V / 30min

シクロフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

エトポシド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

Day3,4

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P+デキサート(6.6mg/2ml) 5V / 30min

キロサイド()mg/body + 生理食塩液 250ml / 3hr

エトポシド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

70歳以上では、シタラビン2/3に減量、エトポシド2/3に減量する。

シタラビン投与当日と翌日(day2-4) : リンデロン点眼液 1日4回(6,12,18,22時) 点眼

※リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

