

# 急性リンパ性白血病, 悪性リンパ腫

## Hyper CVAD療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
シクロfosファミド CPA	エンドキサン	300 mg/m <sup>2</sup> × 2	Day1~3
メスナ	ウロミテキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	Day1~3
ビンクリスチン VCR	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	Day4,11
ドキソルビシン ADM	ドキソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	Day4
デキサメサゾン DEX	デキサート	33(40) mg	Day1~4,11~14

※2mgまで

### Day1~3

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シクロfosファミド ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 3hr (12時間毎)

ウロミテキサン ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 24hr 持続

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シクロfosファミド ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 3hr (12時間毎)

### Day4

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

ドキソルビシン ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

### Day11

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

### Day12~14

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min