

悪性リンパ腫

OB療法(2コース目以降、2日間)

4週毎(初回と併せて、最大6クール)

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
オビヌツズマブ	ガザイバ	1000 mg/body	Day1
ベンダムスチン	トレアキシシ	90 mg/m ²	Day1,2

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 3V
/ 30min ガザイバ投与90分前

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×ガザイバ投与60分前 内服

ベンダムスチン ()mg/body + 注射用水 + 生理食塩液 250ml / 1hr

生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

ガザイバ (1000)mg/body + 生理食塩液 250ml ※

※最終液量を250mlとする。

※25ml/hで投与開始。状態を確認しながら、30min毎に25ml/h ずつ増量可。
最大100ml/hまで(前回投与でGrade2以上の副作用が無かった場合のみ)

※0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用すること

Day2

生理食塩液 100ml / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min

ベンダムスチン ()mg/body + 注射用水 + 生理食塩液 250ml / 1hr

ベンダムスチンの調製方法

1V100mgは注射用水40mL, 1V25mgは注射用水10mLで溶解する。

調製後、3時間以内に投与を終了すること!