

ALI単剤

主治医

ペムトレキセド(アリムタ)単剤療法

ALI コース目

ペムトレキセド(ALI) 500mg/m²(Day1) 3~4週毎

身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
----	----	----	----	------	----------------

投与7日 | メコバラミン注(500 μg) 1A 筋注
以上前~ | フォリアミン錠 0.5mg 1日1回内服

前日~ | デカトロン(0.5mg) 8錠(4mg) 朝食後内服
Day4

Day 1
(/)

- ① メコバラミン注(500 μg) 1A 筋注
- ② 生食 100ml / ルートキープ
- ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
+ デキサート(6.6mg/2ml) 2V 30分でDiv

Y ④ ペムトレキセド()mg/body + 生食100ml 10分でDiv

- ⑤ 生食 100ml 30分でDiv

2016年7月 文責 呼吸器内科

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではメムトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500 μgをレジメンに登録している。