

急性リンパ性白血病, 悪性リンパ腫

R-Hyper CVAD療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日	
リツキシマブ		リツキサン	375 mg/m ²	Day1	
シクロフォスファミド	GPA	エンドキサン	300 mg/m ² × 2	Day2~4	
メスナ		ウロミテキサン	600 mg/m ²	Day2~4	
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m ²	Day5,12	※2mgまで
ドキシソルビシン	ADM	ドキシソルビシン	50 mg/m ²	Day5	
デキサメサゾン	DEX	デキサート	33(40) mg	Day2~5,12~15	

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ※

※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

Day2~4

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シクロフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 3hr (12時間毎)

ウロミテキサン ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 24hr 持続

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シクロフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 3hr (12時間毎)

Day5

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

ドキシソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

Day12

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

Day13~15

デキサート(6.6mg/2ml) 5V + 生理食塩液 100ml / 30min

※ リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

