

# 非ホジキンリンパ腫

## R+THP-COP療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
リツキシマブ	リツキサソ	375 mg/m <sup>2</sup>	Day1
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサソ	750 mg/m <sup>2</sup> Day2
ピラルビシン	THP-DXR	テラルビシン	50 mg/m <sup>2</sup> Day2
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup> Day2
プレドニゾン	PSL	プレドニン	100 mg Day2~6

※2mgまで

### Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠  
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml  
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ( )mg/body + 生理食塩液 1000ml ※  
※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min  
又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

### Day2

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

ピラルビシン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min



シクロフォスファミド ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min  
又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

### Day3~5

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min  
又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

※ 70歳以上の高齢者の場合、PSL100mg×5日間の後、20mg/20mg/10mg/10mgと漸減します。  
※ リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。



年齢による用量調整 (mg/m<sup>2</sup>)

	70歳以上	80歳以上
CPA	650	500
THP-DXF	40	30
VCR	1.4 (max 2mg)	1 (max 1mg)
PSL	40	30