

# 慢性リンパ性白血病

## アーゼラ

2～8回目 初回から1週間隔  
 9回目 8回目から4～5週間後  
 10～12回目 9回目から4週間隔

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
オフアツムマブ	アーゼラ	初回: 300mg/body	Day1
		2回目以降: 2000mg/body	(Day8,15···)

Day1

プレドニン 100mg + 生理食塩水 100mL  
 / アーゼラ投与2時間前より30分かけて点滴静注

カロナール(200) 3錠、ネオマレルミンTR(6) 1錠 アーゼラ投与1時間前 内服

アーゼラ 300mg/body + 生理食塩液 合計1000ml ※

アーゼラは生理食塩水を用いて希釈後の総量として1000mLに用時希釈調製して使用する。

2～8回目は1週間隔で行い、8回目終了後に4～5週間の休薬期間を設ける。  
 以降12回目までは4週間隔で行う。

※12mL/時の投与速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分に観察しながら、投与速度を30分毎に上げることができるが、投与速度の上限は400mL/時とする。

投与開始からの時	初回	2回目以降
～30分	12mL/時	25mL/時
31～60分	25mL/時	50mL/時
61～90分	50mL/時	100mL/時
91～120分	100mL/時	200mL/時
121～150分	200mL/時	400mL/時
151～180分	300mL/時	
181分～	400mL/時	

