

骨髓異形成症候群

アザシチジン(ビダーザ)療法 4週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
アザシチジン	ビダーザ	75 mg/m ²	Day1~7

<点滴静注用>

Day1~7

生理食塩液 100ml / ルートキープ

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

アザシチジン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 10min

※ビダーザ(アザシチジン)の溶解方法

1バイアルにつき注射用蒸留水10mlを注入し、バイアルを激しく振り混ぜて完全に溶解する。溶解液の必要量を生理食塩液50mlに混合する。

溶解後は1時間以内に投与を終了すること。

<皮下注用>

Day1~7

アザシチジン ()mg/body / 皮下注

※ビダーザ(アザシチジン)の溶解方法

1バイアルにつき注射用蒸留水4mlを注入し、バイアルを激しく振り混ぜて均一な懸濁液とする。投与前に再度混和し、均一な懸濁液とすること。必要量が4mlを超える場合には、穿刺部2か所に分ける。

その際、等量ずつ皮下注射する。用量が1V(100mg)を超える場合には、薬剤部にてシリンジを2本に分け針をつけたまま、払い出す。

溶解後は1時間以内に投与を終了すること。