

多発性骨髄腫

エムプリシティ療法

4週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
エムプリシティ	エロツズマブ	10 mg/kg	Day1,8,15,22(1,2コース目)
			Day1,15(3コース目以降)

Day1	
内服	レナデックス(4mg) 7錠 / 1×エロツズマブ(エムプリシティ)投与3時間前
点滴	デキサメタゾン(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 30min エロツズマブ(エムプリシティ)投与90分前
内服	カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠 / 1×エロツズマブ(エムプリシティ)投与60分前
点滴	エロツズマブ(エムプリシティ) ()mg/body + 生理食塩液 ()ml ※ 0.22ミクロン以下のフィルター付きルート使用

レナリドミド及びデキサメタゾンと併用すること。

※ 投与速度

投与時期		投与速度(mL/分)		
		投与開始 0~30分	投与開始 30~60	投与開始 60分以
1コース目	初回	0.5	1	2
	2回目	3	4	
	3~4回目	5		
2コース目以降		5		

※エロツズマブ(エムプリシティ)の溶解方法と希釈液量

300mg製剤は13ml、400mg製剤は17mlの注射用蒸留水で溶解し、25mg/mlの濃度とした後、必要量を通常230mlの生理食塩液(又は5%ブドウ糖液で希釈する。

なお、体重46kg未満の患者では患者の体重に応じて希釈液量を調整する必要がある。

体重(kg)	1回投与量 (mg)	希釈液 量(ml)
30	300	150
32	320	160
34	340	170
36	360	180
38	380	190
40	400	200
42	420	210
44	440	220
46	460	230

用量460mg以上は希釈液量230ml