

## 悪性リンパ腫

## R-大量MTX療法

2週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
リツキシマブ	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	Day1
メトトレキサート	MTX	メトトレキサート	3500 mg/m <sup>2</sup>
			2000 mg/m <sup>2</sup>
			Day2 (70歳以上)

## Day1

カロナール(200) 3錠 , d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(6) 1錠  
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml  
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ( )mg/body + 生理食塩液 1000ml ※<sup>1</sup>

※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

## Day2

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 15min

メトトレキサート ( )mg/body + 5%ブドウ糖液 300ml / 3hr

※10時投与開始

MTX投与開始24時間後より6時間毎に最低8回投与  
 MTX48時間後に血中濃度 $1\mu\text{mol/L}$ 以下、72時間後に血中濃度 $0.1\mu\text{mol/L}$ 以下で投与終了  
 MTX投与開始48時間後血中濃度  $>1\mu\text{mol/L}$ の場合は50mg/回に増量  
 MTX投与開始72時間後血中濃度  $>0.1\mu\text{mol/L}$ の場合は50mg/回に増量  
 MTX血中濃度測定 MTX投与開始から48時間後、72時間後

Day 2よりアプレピタントカプセル内服を開始  
 尿のpH $>7.0$ を保つようにメイロンを点滴内に混注  
 利尿剤はアセタゾラミドを使用

腎機能	MTX投与量
$\text{CCr} \geq 80$	100%Dose
$80 \geq \text{CCr} \geq 60$	80%Dose
$60 > \text{CCr} > 50$	60%Dose
$50 \geq \text{CCr}$	not administered

※1 リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

