

主治医

シスプラチン + ペトレキセド(アリムタ)併用療法

CDDP+ALI

コース目

(標準6コース)

シスプラチン(CDDP) 56~75mg/m² (Day1)ペトレキセド(ALI) 375~500mg/m² (Day1)

3~4週毎

身長	体重	体表面積
cm	kg	m ²

投与7日
以上前~ | メコバラミン注(500 μ g) 1A 筋注
パンピタン末 1g 1日1回内服

前日及び
Day2,3 | デカドロン錠(4mg) 1錠 朝食後内服

Day 1

① メコバラミン注(500 μ g) 1A 筋注

(/)

② 生食 100ml / ルートキープ

③ プロイメント注(150mg) 1V

+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生食250ml 60分でDiv

④ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv

Y ⑤ ペトレキセド()mg/body + 生食100ml 10分でDiv

⑥ 生食 100ml 30分でDiv

⑦ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A 60分でDiv

⑧ 生食 500ml 60分でDiv

⑨ マンニトール 300ml 30分でDiv

Y ⑩ シスプラチン()mg/body + 生食300ml 120分でDiv

⑪ ソルデム3A 500ml 60分でDiv

2016年7月 文責 呼吸器内科

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではペトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500 μ gをレジメンに登録している。