

非小細胞肺癌に対する

シスプラチン + TS-1内服併用療法(3週毎)

CDDP+S-1

コース目

シスプラチン(CDDP) 60mg/m² (Day1)

TS-1(S-1) 80mg/m²(Day1~14内服、1~2週休薬)

3週毎

身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²	Cr mg/dl
----------	----------	------------------------	-------------

TS-1(S-1) BSA<1.25 20mg 4cp 2x(80mg/day)

1.25 ≤ BSA < 1.5 25mg 4cp 2x(100mg/day)

BSA ≤ 1.5 20mg 6cp 2x(120mg/day)

80 > Ccr ≥ 60ml/minでは1段階減量、Ccr < 60ml/minでは投与不可

Ccr = 体重(kg) x (140 - 年齢) / 72 x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

Day1~Day14	TS-1 内服	Day15~Day21	休薬(TS-1中止)
------------	---------	-------------	------------

Day2,3 | デカドロン錠(4mg) 1錠 朝食後内服

Day 1 ① 生食 100ml / ルートキープ

(/)

② プロイメント注(150mg) 1V

+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生食250ml 60分でDiv

③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv

④ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A 60分でDiv

⑤ 生食 500ml 60分でDiv

⑤ マンニトール 300ml 30分でDiv

Y ⑥ シスプラチン ()mg/body + 生食300ml 120分でDiv

⑦ ソルデム3A 500ml 60分でDiv