

カルボプラチン + ペトレキセド(アリムタ)併用療法

CBDCA+ALI コース目(標準6コース)

カルボプラチン(CBDCA)	AUC 4~ <u>5</u> ~6 (Day1)	3~4週毎
ペトレキセド(ALI)	375~ <u>500</u> mg/m ² (Day1)	

身長	体重	体表面積
cm	kg	m ²

Cr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72 x Cr(mg/dl)
 女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)
 CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Cr +25)

投与7日 | メチコバル注(500 μg) 1A 筋注
 以上前~ | パンビタン末 1g 1日1回内服

前日~ | デキサロン 4mg 8錠(1mg) 朝食後内服
 Day4 |

- Day 1 (/)
- ① メコバラミン注(500 μg) 1A 筋注
 - ② 生食 100ml / ルートキープ
 - ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
 + デキサート(6.6mg/2ml) 2V 30分でDiv
 - Y ④ ペトレキセド()mg/body + 生食100ml 10分でDiv
 - ⑤ 生食 100ml 20分でDiv
 - Y ⑥ カルボプラチン()mg/body + 生食250ml 60分でDiv
 - 生食 100ml 30分でDiv

2016年7月 文責 呼吸器内科

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではメトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500 μgをレジメンに登録している。