

非扁平上皮がん

キイトルーダ(ペムブロリズマブ)+シスプラチン+アリムタ(ペメトレキセド)併用療法
3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	d1
ペメトレキセド	PEM アリムタ	500mg/m2	d1
シスプラチン	CDDP シスプラチン	75mg/m2	d1

投与7日 以上前～	メチコパール注(500 μ g) 1A im パンピタン末 1g 1日1回内服
--------------	--

Day1	デカドロン錠(4mg) 1錠 朝食後内服
------	----------------------

Day1	<p>① メコバラミン注(500μg) 1A 筋注 ※</p> <p>② 生理食塩液 100ml / ルートキープ</p> <p>③ プロイメンド注(150mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生食250ml / 60min</p> <p>④ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min</p> <p>Y ⑤ <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min</td></tr><tr><td>0.2~5μm以下のインラインフィルター付ルートを使用</td></tr></table></p> <p>⑥ 生食 100ml / 30min</p> <p>Y ⑦ <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>ペメトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min</td></tr></table></p> <p>⑧ 生食 100ml / 30min</p> <p>⑨ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min</p> <p>⑩ 生食 500ml / 60min</p> <p>⑪ マンニトール 300ml / 30min</p> <p>Y ⑫ <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>シスプラチン()mg/body + 生食300ml / 120min</td></tr></table></p> <p>⑬ ソルデム3A 500ml / 60min</p>	ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min	0.2~5 μ m以下のインラインフィルター付ルートを使用	ペメトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min	シスプラチン()mg/body + 生食300ml / 120min
ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min					
0.2~5 μ m以下のインラインフィルター付ルートを使用					
ペメトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min					
シスプラチン()mg/body + 生食300ml / 120min					

※添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではメペトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500 μ gをレジメンに登録している。