

非扁平上皮がん

キイトルーダ(ペムブロリズマブ)+カルボプラチン+アリムタ(ペメトレキセド)併用療法 3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ペムブロリズマブ		キイトルーダ	200mg/body	d1
ペメトレキセド	PEM	アリムタ	500mg/m ²	d1
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	d1

$Ccr(\text{Cockcroft-Gault}) = \text{体重}(\text{kg}) \times (140 - \text{年齢}) / 72 \times Cr(\text{mg/dl})$

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

$\text{CBDCA dose}(\text{mg/body}) = \text{AUC} \times (Ccr + 25)$

投与7日 以上前～	メチコパール注(500 μ g) 1A im パンビタン末 1g 1日1回内服
--------------	--

Day1	デカドロン錠(4mg) 1錠 朝食後内服
------	----------------------

Day1	① メコバラミン注(500 μ g) 1A 筋注 ※ ② 生理食塩液 100ml / ルートキープ ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 2V /30min Y ④ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min</td></tr><tr><td>0.2~5μm以下のインラインフィルター付ルートを使用</td></tr></table> ⑤ 生食 100ml / 30min Y ⑥ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>ペメトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min</td></tr></table> Y ⑦ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min</td></tr></table> ⑧ 生食 100ml / 30min	ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min	0.2~5 μ m以下のインラインフィルター付ルートを使用	ペメトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min	カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min
ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min					
0.2~5 μ m以下のインラインフィルター付ルートを使用					
ペメトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min					
カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min					

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではペメトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500 μ gをレジメンに登録している。