

## 扁平上皮がん

### キイトルーダ(ペムブロリズマブ)+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ペムブロリズマブ		キイトルーダ	200mg/body	d1
パクリタキセル	PTX	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	d1
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5~6	d1

$Ccr(\text{Cockcroft-Gault}) = \text{体重}(\text{kg}) \times (140 - \text{年齢}) / 72 \times Cr(\text{mg/dl})$

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

$\text{CBDCA dose}(\text{mg/body}) = \text{AUC} \times (Ccr + 25)$

Day1	
①	生理食塩液 100ml / ルートキープ
②	デキサート(6.6mg/2ml) 2.5V + ポララミン(5mg) 1A + ラニチジン(50mg) 1A + グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
Y ③	ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min 0.2~5 $\mu$ m以下のインラインフィルター付ルートを使用
④	生食 100ml / 30min
Y ⑤	パクリタキセル( )mg/body + 生食500ml / 180min インラインフィルター付ルート使用 滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節
Y ⑥	カルボプラチン( )mg/body + 生食250ml / 60min
⑦	生食 100ml / 30min