

# 非小細胞肺癌(導入療法4サイクル又は6サイクル)

## テセントリク(アテゾリズマブ)+カルボプラチン +パクリタキセル+アバステン(ベバシズマブ)併用療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
アテゾリズマブ		テセントリク	1200mg/body	d1
ベバシズマブ	Bev	アバステン	15mg/kg	d1
パクリタキセル	PTX	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	d1
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5~6	d1

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72 x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day1	① 生食 100ml / ルートキープ
	② デキサート(6.6mg/2ml) 2.5V + ポララミン(5mg) 1A + ラニチジン(50mg) 1A + グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P/ 30min
Y	③ <u>アテゾリズマブ 1200mg/body + 生食250ml /※</u> 0.2または0.22 μmのインラインフィルター付ルートを使用 ※初回は60分、忍容性が良好であれば2回目以降は30分でDiv
	④ 生食 100ml /30min
Y	⑤ <u>パクリタキセル( )mg/body + 生食500ml /180min</u> インラインフィルター付ルート使用 滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節
Y	⑥ <u>カルボプラチン( )mg/body + 生食250ml / 60min</u>
Y	⑦ <u>ベバシズマブ( )mg/body + 生食100ml /※</u> ※初回90分、2回目60分、以降30分でDiv
	⑧ 生食 100ml /30min