

未治療の非小細胞肺癌

アテゾリズマブ+カルボプラチン+ペムトレキセド併用療法

※導入療法として4又は6コース

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
アテゾリズマブ		テセントリク	1200mg/body	d1
ペムトレキセド	PEM	アリムタ	500mg/m ²	d1
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	d1

Cr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) × (140-年齢) / 72 × Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC × (Cr + 25)

投与7日 以上前～	メチコパール注(500μg) 1A im パンビタン末 1g 1日1回内服
--------------	------------------------------------------

Day1	デカロン錠(4mg) 1錠 朝食後内服
------	---------------------

Day1	<p>① メコバラミン注(500μg) 1A 筋注 ※</p> <p>② 生理食塩液 100ml / ルートキープ</p> <p>③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 2V /30min</p> <p>Y ④ <u>アテゾリズマブ 1200mg/body + 生食250ml /※</u> 0.2または0.22μmのインラインフィルター付ルートを使用 ※初回は60分、忍容性が良好であれば2回目以降は30分でDiv</p> <p>⑤ 生食 100ml / フラッシュ用</p> <p>Y ⑥ <u>ペムトレキセド()mg/body + 生食100ml/10min</u></p> <p>⑦ 生食 50ml / 全開フラッシュ</p> <p>Y ⑧ <u>カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min</u></p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではペムトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500μgをレジメンに登録している。