

化学療法未治療のEGFR及びALK陰性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌  
ニボルマブ(オプジーボ)q3w+イピリムマブ(ヤーボイ)併用療法

6週毎(最長24か月)

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ニボルマブ	オプジーボ	360mg/body	d1、22
イピリムマブ	ヤーボイ	1mg/kg	d1

Day 1

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- Y ② **ニボルマブ360mg/body + 生食50ml 30分でDiv**  
0.2又は0.22 $\mu$ mのインラインフィルター付ルートを使用
- ③ 生食 100ml 30分でDiv/フラッシュ
- Y ④ **イピリムマブ( )mg/body + 生食20ml 30分でDiv**  
0.2又は0.22 $\mu$ mのインラインフィルター付ルートを使用  
ニボルマブ投与終了後、30分以上あけて、投与を開始すること  
生食又は5%糖液を用いて、1~4mg/mlの濃度に希釈すること  
1~4mg/ml確保のため、生食50ml→生食20mlにして使用

Day 22

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- Y ② **ニボルマブ360mg/body + 生食50ml 30分でDiv**  
0.2又は0.22 $\mu$ mのインラインフィルター付ルートを使用