

担当医

小細胞肺癌に対する

カルボプラチン + エトポシド併用療法

CBDCA+VP-16 コース目

カルボプラチン(CBDCA) AUC 4~5(Day1)

エトポシド(VP-16) 80~100mg/m²(Day1-3) 3~4週毎

身長	体重	体表面積	Cr
cm	kg	m ²	mg/dl (Ccr ml/min)

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)
 女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)
 CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day 1

(/)

① 生食 100ml / ルートキープ

② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
 + デキサート(6.6mg/2ml) 1V 30分でDiv

Y ③ エトポシド()mg/body + 生食500ml 120分でDiv

Y ④ カルボプラチン()mg/body + 生食250ml 60分でDiv

⑤ 生食 100ml 30分でDiv

Day 2

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv
- Y ③ エトポシド()mg/body + 生食500ml 120分でDiv
- ④ 生食 100ml 30分でDiv

Day 3

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv
- Y ③ エトポシド()mg/body + 生食500ml 120分でDiv
- ④ 生食 100ml 30分でDiv