

## 小細胞肺癌(進展型)

### テセントリク(アテゾリズマブ)+カルボプラチン+エトポシド併用療法

3週毎

※4コース目まで。以降アテゾリズマブ単剤での維持療法

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
アテゾリズマブ		テセントリク	1200mg/body	d1
エトポシド	VP-16	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	d1,2,3
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	d1

Cr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Cr + 25)

Day1 イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間前に内服

Day2,3 イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1	
	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
	② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
Y	③ <u>アテゾリズマブ 1200mg/body + 生食250ml / ※</u> 0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用 ※初回は60分、忍容性が良好であれば2回目以降は30分でDiv
	④ 生食 100ml /フラッシュ用
Y	⑤ <u>エトポシド( )mg/body + 生食500ml / 120min</u>
Y	⑥ <u>カルボプラチン( )mg/body + 生食250ml / 60min</u>
	⑦ 生食 100ml /フラッシュ用

Day2,3	
	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
	② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) / 30min
Y	③ <u>エトポシド( )mg/body + 生食500ml / 120min</u>
	④ 生食 100ml /フラッシュ用