

# 大腸がん

## FOLFIRI+セツキシマブ療法

1kur=2週

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
セツキシマブ	Cet	アービタックス	初回: 400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降: 250mg/m <sup>2</sup>	Day1,8
塩酸イリノテカン	CPT-11	カンプト	180 mg/m <sup>2</sup>	Day1
レボホリナート	I-LV	アイソボリン	200 mg/m <sup>2</sup>	Day1
フルオロウラシル	5-FU(急速静注)	5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	Day1
	5-FU(持続点滴)		2400 - 3000 mg/m <sup>2</sup>	Day1

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

ポララミン(5mg) 2A + デカドロン(6.6mg/2ml) 1V  
+ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

または

ポララミン(5mg) 2A + デカドロン(6.6mg/2ml) 1V  
+ アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

セツキシマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / ※

生理食塩液 100mL / 60min (経過観察)

レボホリナート ( )mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

塩酸イリノテカン ( )mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 46hr

Day8

生理食塩液 100ml / ルートキープ

ポララミン(5mg) 2A + デカドロン(6.6mg/2ml) 1V  
+ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

セツキシマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / ※

生理食塩液 100mL / 60min (経過観察)

※ セツキシマブ(アービタックス)は初回は2時間で、2回目以降は1時間で投与する。