

大腸がん

FOLFOXIRI療法

2週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
オキサリプラチン L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	Day1
イリノテカン CPT-11	イリノテカン	165 mg/m ²	Day1
レボホリナート I-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	Day1
フルオロウラシル 5-FU	5-FU	3200 mg/m ²	Day1

Day1 イメドカプセル(125) 1C 1× オキサリプラチン投与60～90分前に内服

Day2,3 イメドカプセル(80) 1C 1× 朝食後

Day2～4 デカドロン錠(4mg) 2T 2× 朝昼食後

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ イリノテカン ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 90min

④ 生理食塩液 100ml / シングルルートプライミング用

S ⑤ レボホリナート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

オキサリプラチンと同時に
シングルルート使用

Y ⑥ オキサリプラチン ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

レボホリナートと同時に

Y ⑦ フルオロウラシル ()mg/body
+ 生理食塩液 250ml または 500ml / 46hr ※

生理食塩液 20ml(救急カート用シリンジ)

/ インフューザーポンプ抜針用(外来・オーダー入力は当日に)

生理食塩液 100ml / フルオロウラシル46時間投与後のフラッシュ用(入院)

※) 外来はインフューザーポンプ使用ため、生理食塩液は250mlを選択する。
入院は500mlの輸液バッグで投与する。