

大腸がん

SOX(130)+ベバシズマブ療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ベバシズマブ	アバスチン	7.5mg/kg	Day1
オキサリプラチン L-OHP	エルプラット	130mg/m ²	Day1
TS-1	TS-1	1日80mg/m ² 1日2回に分けて	1日目夕～ 15日目朝

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

または

アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

【外来→アロキシ 入院→グラニセトロン】

ベバシズマブ ()mg/body + **生理食塩液 100ml / ※**

生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

オキサリプラチン ()mg/body + **5%ブドウ糖液 250ml / 2hr**

内服 TS-1 ()mg/body 2×朝夕食後 14日分(1日目夕～15日目朝)

体表面積	TS-1 用量
<1.25m ²	80mg/day (40mg/回 × 2/day)
1.25m ² ≤ ~ <1.5m ²	100mg/day (50mg/回 × 2/day)
1.5m ² ≤	120mg/day (60mg/回 × 2/day)

※) ベバシズマブ(アバスチン)の投与時間は初回は90分で行い、以後特に問題がなければ、2回目は60分、3回目以降は30分で投与できる。