

大腸がん

セツキシマブ+イリノテカン療法

6週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
セツキシマブ Get	アービタックス	初回: 400mg/m ² 2回目以降: 250mg/m ²	Day1,8,15...
イリノテカン CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	Day1,8,15,22

(4週投与2週休薬)

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② ポララミン(5mg/1ml) 2A + デキサート(6.6mg/2ml) 1A
+ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
- または
- ② ポララミン(5mg/1ml) 2A + デキサート(6.6mg/2ml) 1A
+ アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min
【外来→アロキシ 入院→グラニセトロン】

Y ③ セツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / ※1

④ 生理食塩液 100ml / 60min (経過観察)※2

Y ⑤ イリノテカン ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 90min

※1 セツキシマブ(アービタックス)は初回は2時間で、2回目以降は1時間で投与する。

※2 投与後の観察時間は認容性に問題が無ければ、2回目以降30分に短縮可とする。