


胃がん

nab-PTX + ラムシルマブ療法

4週毎

薬剤	商品名	投与量	投与日
ラムシルマブ	サイラムザ	8 mg/kg	Day1,15
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	アブラキサン	100 mg/m ²	Day1,8,15



Day1,15

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② デキサート(6.6mg/2ml) 2V + ポララミン(5mg/1ml) 1A
+ 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ ラムシルマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min

インラインフィルター付ルート使用
全量が250mlとなるように調製

④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

※別ルートを使用(インラインフィルター付ルートは使用しないで下さい。)
※全てバッグアダプタを使用

S ⑤ 生理食塩液 100ml / ルートキープ

S ⑥ アブラキサン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min

S ⑦ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

Day8

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② デキサート(6.6mg/2ml) 2V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ アブラキサン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min

④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

インラインフィルター付ルートは使用しないで下さい！！

・調製方法

①1バイアルあたり生理食塩液20mlを、バイアルの内壁伝いに、直接内容物にかけないよう泡立ちに注意しながらゆっくりと注入する。

②内容物が確実に濡れるよう5分間以上バイアルを静置する。

③生理食塩液のバッグから残液を廃棄し、空のバッグを作る。

④内容物が十分に濡れたら、均一な白色ないし黄色の懸濁液になるまで、泡立たないよう混和する。

⑤必要量をバイアルから抜き取り、③で用意した空のバッグにゆっくりと注入する。

※パクリタキセル(アルブミン懸濁型)は特定生物由来製品です。

そのため、「輸血用血液製剤及び血漿分画製剤使用承諾書(特定生物由来製品使用承諾書)」による患者の承諾が必要です。