

# 進行・再発胃がん

## SP+Herceptin(3週/1コース)療法 1kur=3週

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
トラスツズマブ	Herceptin	ハーセプチン	初回; 8mg/kg 2回目以降; 6mg/kg	Day1
シスプラチン	CDDP	ランダ	60mg/m <sup>2</sup>	Day1
TS-1		TS-1	80mg/m <sup>2</sup>	Day1 夕～15朝 2週投与-1週休薬

TS-1(S-1)	BSA<1.25	20mg 4cp 2x(80mg/day)
	1.25≤BSA<1.5	25mg 4cp 2x(100mg/day)
	BSA≤1.5	20mg 6cp 2x(120mg/day)
80>Ccr≥60ml/minでは1段階減量、Ccr<60ml/minでは投与不可		

Day1 夕～15朝 | TS-1 ( )mg 2×朝夕食後 14日分

Day1 | イメドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服

Day2,3 | イメドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day2～4 | デカドロン0.5mg錠 8～16錠 2×朝夕食後 3日分

Day1	生理食塩液 100ml / ルートキープ
	アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + 生理食塩液 100ml / 30min
	トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
	トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min (2回目以降)
	シスプラチン ( )mg/body + 生理食塩液 350ml / 2hr
	ソリューゲンF 500ml + ラシックス(20mg/2ml) 0.5A / 90min
	ソリューゲンF 500ml / 90min