

胃がん

XELOX+HER療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
トラスツズマブ	ハーセプチン	初回; 8mg/kg 2回目以降; 6mg/kg	Day1
オキサリプラチン	L-OHP エルプラット	130mg/m ²	Day1
カペシタビン	ゼローダ	1回1000mg/m ² 1日2回	1日目午後～ 15日目午前

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
または
- ② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min
【外来→アロキシ 入院→グラニセトロン】

Y ③ トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
(2回目以降)

Y ④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y字から投与, バッグアダプタ使用

Y ⑤ オキサリプラチン ()mg/body + **5%ブドウ糖液 500ml** / 2hr

内服 ゼローダ ()mg/body 2×朝夕食後 14日分(1日目午後～15日目午前)

体表面積	ゼローダ1回用量
<1.36m ²	1,200mg(4錠)
1.36m ² ≤ ~ <1.66m ²	1,500mg(5錠)
1.66m ² ≤ ~ <1.96m ²	1,800mg(6錠)
1.96m ² ≤	2,100mg(7錠)