

# 進行・再発胃がん

## XP+Herceptin療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
トラスツズマブ	Herceptin	ハーセプチン	初回;8mg/kg
			2回目以降;6mg/kg
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>
カペシタビン		ゼローダ	1回1000mg/m <sup>2</sup> 1日2回
			Day1 Day1夕~15朝 2週投与-1週休薬

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服  
Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1
生理食塩液 100ml / ルートキープ
グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 30min
トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min (2回目以降)
シスプラチン ( )mg/body + <b>生理食塩液</b> 350ml / 2hr
ソリューゲンF 500ml + ラシックス(20mg/2ml) 0.5A / 90min
ソリューゲンF 500ml / 90min

Day1夕~15朝 | カペシタビン ( )mg 2×朝夕食後 14日分  
Day2~4 | デキサート0.5mg錠 8~16錠 2×朝夕食後 3日分

体表面積	ゼローダ1回用量
<1.36m <sup>2</sup>	1,200mg(4錠)
1.36m <sup>2</sup> ≤ ~ <1.66m <sup>2</sup>	1,500mg(5錠)
1.66m <sup>2</sup> ≤ ~ <1.96m <sup>2</sup>	1,800mg(6錠)
1.96m <sup>2</sup> ≤	2,100mg(7錠)

※ 予定より投与が遅れた場合、以下のとおり投与することが望ましい(添付文書より)  
 (1) 1週間以内の遅れの場合は、6mg/kgを投与する。  
 (2) 1週間を超えた場合は、改めて8mg/kgで投与を行う。  
 次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。