

# 肝細胞癌

## TACE(CDDP/LPD)療法 50・100

4～6週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
シスプラチン	CDDP	アイエーコール 65 mg/m <sup>2</sup>	Day1

### Day1

ソリューゲンF 500ml / 2hr (6時～8時)

ソリューゲンF 500ml / 2hr (8時～10時)

アタラックスP(25mg/1ml) 1A + ソセゴン(15mg/1ml) 1A / 筋注

① グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

② アイエーコール 50 mg + リピオドール 5 ml / 適宜ワンショット  
または  
アイエーコール 100 mg + リピオドール 10ml / 適宜ワンショット

ソルデム3A 500ml / 6hr (10時～16時)

ソリューゲンF 500ml / 6hr (16時～22時)

セフオン(1g) 1V + 生理食塩液 50ml / 30min (20:00～20:30)

ソリューゲンF 500ml / 6hr (22時～翌4時)

### Day2,3

ソルデム3A 500ml / 6hr (4時～10時)

ソリューゲンF 500ml / 12hr (10時～22時)

セフオン(1g) 1V + 生理食塩液 50ml / 30min (10:00～10:30)

セフオン(1g) 1V + 生理食塩液 50ml / 30min (20:00～20:30)

ソリューゲンF 500ml / 12hr (22時～翌10時)

### Day4,5

ソリューゲンF 500ml / 12hr (10時～22時)

ソリューゲンF 500ml / 12hr (22時～翌10時)