

# 肝細胞癌

## 動注CDDP療法

4～6週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
シスプラチン	CDDP	アイエーコール 65 mg/m <sup>2</sup>	Day1

Day1	
ソリューゲンF	500ml / 2hr (6時～8時)
ソリューゲンF	500ml / 2hr (8時～10時)
アタラックスP(25mg/1ml) 1A + ソセゴン(15mg/1ml) 1A	/ 筋注
① グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P	/ 30min
② アイエーコール ( )mg + 生理食塩液 ( )ml	/ 30min ※
ソルデム3A	500ml / 6hr (10時～16時)
ソリューゲンF	500ml / 6hr (16時～22時)
セフオン(1g) 1V + 生理食塩液 50ml	/ 30min (20:00～20:30)
ソリューゲンF	500ml / 6hr (22時～翌4時)

Day2,3	
ソルデム3A	500ml / 6hr (4時～10時)
ソリューゲンF	500ml / 12hr (10時～22時)
セフオン(1g) 1V + 生理食塩液 50ml	/ 30min (10:00～10:30)
セフオン(1g) 1V + 生理食塩液 50ml	/ 30min (20:00～20:30)
ソリューゲンF	500ml / 12hr (22時～翌10時)

Day4,5	
ソリューゲンF	500ml / 12hr (10時～22時)
ソリューゲンF	500ml / 12hr (22時～翌10時)

※ アイエーコールが $100\text{mg}/70\text{ml}$ となるように溶解する。