

食道がん(術前)

DCF 療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	70 mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	750 mg/m ²	Day1~5
ドセタキセル	DOC	タキソテール	70 mg/m ²	Day1

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服

Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day5~15 | シプロキサニ錠(100) 1日3回毎食後 1回2錠

Day1

- ① ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ② 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
- ④ ドセタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 1hr
- ⑤ シスプラチン ()mg + **生理食塩液 300ml** / 2hr
- ⑥ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑦ ソルデム3A 500ml + ラシックス(20mg/1ml) 1A / 90min
- ⑧ マンニトール 300ml / 30min
- ⑨ ソルデム3A 500ml / 90min
- ⑩ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

Day2~5(ただし、Day4,5はフルオロウラシルのみ)

- ① グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
- ② ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ③ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ④ マンニトール 300ml / 30min
- ⑤ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ⑥ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続