

食道がん

FAN療法

4週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	600 mg/m ²	Day1-7
ドキソルビシン	ADR	ドキソルビシン	50 mg/m ²	Day1
ネダプラチン		アクプラ	80 mg/m ²	Day1

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
 Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

前日

① 生理食塩液 500ml / 3hr

側管 | ベネクトミン(200mg) 1A + 生理食塩液 50ml / 10min

② 生理食塩液 500ml / 3hr

③ ラクテックD 500ml / 3hr

Day1

① ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min

② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

③ フルオロウラシル ()mg + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

④ ドキソルビシン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

⑤ 生理食塩液 50ml / 10min

⑥ ネダプラチン ()mg + 生理食塩液 500ml / 90min

⑦ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min

⑧ ソルデム3A 500ml / 90min

⑨ マンニトール 300ml / 30min

Day2~3

- ① ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
- ③ フルオロウラシル ()mg + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続
- ④ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑤ ソルデム3A 500ml / 90min
- ⑥ マンニトール 300ml / 30min

Day4~7

- ① グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
- ② フルオロウラシル ()mg + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続