

# 食道がん

## FP(CDDP 70/5-FU 700) 療法

3週毎※

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	700 mg/m <sup>2</sup>	Day1~5

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服  
 Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

- ① ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ② 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
- Y ④ シスプラチン ( )mg + **生理食塩液 300ml / 2hr**
- Y ⑤ **フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続**
- ⑥ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑦ ソルデム3A 500ml + ラシックス(2mg/1ml) 1A / 90min
- ⑧ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
- ⑨ マンニトール 300ml / 30min
- ⑩ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min

Day2~5(ただし、Day4,5はフルオロウラシルのみ)

- ① グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
- Y ② **フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続**
- ③ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ④ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑤ マンニトール 300ml / 30min
- ⑥ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min

※) 化学療法単独の場合は3週毎、化学放射線療法の場合は4週毎とする。