

軟部腫瘍

AI療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
イフォスファミド	IFM	イホマイド	2 g/m ²	Day1-5
ドキシソルビシン	ADM	ドキシソルビシン	30 mg/m ²	Day1,2
ウロミテキサン		メスナ	400 mg/m ²	Day1-5

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
 Day2-5 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1,2

- ① グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 30min
- Y ②

イフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 4hr

- ③ メスナ ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min
- Y ④

ドキシソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 2hr

- ⑤ メスナ ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min
- ⑥ メスナ ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min
- ⑦ グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

Day3-5

- ① グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 30min
- Y ②

イフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 4hr

- ③ メスナ ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min
- ④ メスナ ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min
- ⑤ メスナ ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min
- ⑥ グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

その他、側管から1日3000mlの輸液を投与し、尿量を確保する。