

乳がん

w-PTX+3w-HER療法

1kur=3週毎

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
パクリタキセル PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	(Day1,8,15,・・・)
トラスツズマブ Herceptin	ハーセプチン	初回; 8mg/kg 2回目以降; 6mg/kg	Day1 (Day22,43・・・)

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 2A
+ ラニチジン(50mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

- Y ③ トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
(2回目以降)※

- Y ④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y字から投与, バッグアダプタ使用

- Y ⑤ パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min
インラインフィルター付ルート使用
滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節

Day8,15

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 2A
+ ラニチジン(50mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

- Y ③ パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min
インラインフィルター付ルート使用
滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節

※ 初回投与時の忍容性が良好であれば、投与時間を30分まで短縮可。