

# 未治療の転移再発トリプルネガティブ乳癌

## アテゾリズマブ(テセントリク)840+nab-PTX(アブラキサン)併用療法

4週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
アテゾリズマブ	テセントリク	840mg/body	d1,15
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15

Day1,15	<p>① 生理食塩液 100ml / ルートキープ</p> <p>② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 2V /30min</p> <p>Y ③ <u>アテゾリズマブ 840mg/body + 生食250ml /※</u> 0.2または0.22 μmのインラインフィルター付ルートを使用 ※初回は60分、忍容性が良好であれば2回目以降は30分でDiv</p> <p>④ 生食 50ml / 全開フラッシュ</p> <p>S⑤ 生理食塩液 100ml / ルートキープ ※別ルートを使用(インラインフィルター付ルートは使用しないで下さい。) ※以下全てバッグアダプタを使用</p> <p>S⑥ <u>パクリタキセル(アルブミン懸濁型)( )mg/body + 生食50ml / 30min</u></p> <p>S⑦ 生食 100ml /30min</p>
---------	---

day8	<p>① 生食 100ml / ルートキープ</p> <p>② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min</p> <p>③ 生理食塩液 50ml /全開(フラッシュ)</p> <p>Y ④ <u>パクリタキセル(アルブミン懸濁型)( )mg/body + 生食50ml / 30min</u></p> <p>Y ⑤ 生食 100ml /30min Y字から投与, バッグアダプタ使用</p>
------	--

day1,15

