

# 乳がん

## 3wDOC(75)+PER+3wHER療法

3週毎

薬剤・略号等		商品名	投与量	投与日
ドセタキセル	DOC	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	Day1
ペルツズマブ	PER	パージェタ	初回; 840mg/body	Day1
			2回目以降; 420mg/body	(Day22,43...)
トラスツズマブ	HER	ハーセプチン	初回; 8mg/kg	Day1
			2回目以降; 6mg/kg	(Day22,43...)

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y ② ペルツズマブ 初回; 840mg、2回目以降; 420mg/body  
+ 生理食塩液 250ml / ※1

経過観察 / ※2

Y ③ トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / ※3

④ アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 2V  
+ 生理食塩液 100ml / 30min

Y ⑤ ドセタキセル ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min

Day2~4 | デカドロン錠(0.5mg) 8T 2×朝昼食後

※1 初回は60分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間で投与可。

※2 パージェタの投与時間と同じ時間、経過観察。

※3 初回は90分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間で投与可。

《投与間隔について》

予定された投与が遅れた場合には、以下の通り投与することが望ましい。

- ① 前回投与日から6週間未満のときには、420mgを投与する。
- ② 前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量の840mgで投与を行う。なお、次回以降は420mgを3週間間隔で投与する。