

乳がん

wPTX+3wHER+3wPER

3週毎

薬剤・略号等		商品名	投与量	投与日
パクリタキセル	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1.8
ペルツズマブ	PER	パージェタ	初回; 840mg/body	Day1
			2回目以降; 420mg/body	(Day22,43…)
トラスツズマブ	HER	ハーセプチン	初回; 8mg/kg	Day1
			2回目以降; 6mg/kg	(Day22,43…)

Day1	
	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
Y ②	ペルツズマブ 初回; 840mg、2回目以降; 420mg/body + 生理食塩液 250ml / ※1
	経過観察 / ※2
Y ③	トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回) トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min (2回目以降)※3
	④ グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min
Y ⑤	パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min インラインフィルター付ルート使用

Day8	
	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
	② グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min
Y ③	パクリタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min インラインフィルター付ルート使用

※1 初回は60分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間で投与可。

※2 パージェタの投与時間と同じ時間、経過観察。

※3 初回投与時、忍容性が良好であれば2回目以降は30分間で投与可。

《投与間隔について》

予定された投与が遅れた場合には、以下の通り投与することが望ましい。

- ① 前回投与日から6週間未満のときには、420mgを投与する。
- ② 前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量の840mgで投与を行う。なお、次回以降は420mgを3週間間隔で投与する。