

切除不能な進行・再発乳がん

PER+VNR+3w-HER療法

3週毎

| 薬剤・略号等 | 商品名 | 投与量 | 投与日 |
|---------|------|-----------------------------------|--------|
| ビノレルビン | ロゼウス | 25 mg/m ² | Day1,8 |
| トラスツズマブ | HER | 初回;8mg/kg 2回目以降;6mg/kg | Day1 |
| ペルツズマブ | PER | 初回;840mg/body 2回目以降;420mg/body | Day1 |

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y ② ペルツズマブ 初回;840mg、2回目以降;420mg/body
+ 生理食塩液 250ml / ※1

経過観察 / ※2

Y ③ トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
(2回目以降)※3

Y ④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y字から投与, バッグアダプタ使用

⑤ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 15min

Y ⑥ ビノレルビン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 10min

⑦ 生理食塩液 250ml / 全開

Day8

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 15min

Y ③ ビノレルビン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 10min

④ 生理食塩液 250ml / 全開

※1 初回は60分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間で投与可。

※2 パージェタの投与時間と同じ時間、経過観察。

※3 初回は90分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間100mlで投与可。