

がん性髄膜炎

MTX髄注

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
メトレキサート	MTX	メトレキサート	10 mg/body Day1

Day0 | デカドロン錠(0.5mg) 2錠
ファモチジンOD錠(20mg) 1錠 1日1回寝る前内服
ロラゼパム錠(0.5mg) 1錠 1日1回寝る前内服 (患者の状況により使用を考慮する)

Day1 | デカドロン錠(0.5mg) 2錠
ファモチジンOD錠(20mg) 1錠 1日1回朝食後内服
エチゾラム錠(0.5) 1錠 1日1回朝食後内服 (患者の状況により使用を考慮する)
ナウゼリン坐剤(60) 1個 1日1回8時

入院

Day1

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

デキサート(6.6mg/2ml)1V / 髄注
※医師がシリンジに採取

メトレキサート 10mg + 生理食塩液 4ml / 髄注

※5mlのシリンジを使用して調製

生理食塩液 3ml / フラッシュ・髄注
※医師がシリンジに採取

ロイコボリン注(3mg) 3A / MTX投与後 6時間ごとに4回 静注

外来

Day1

デキサート(6.6mg/2ml)1V / 髄注
※医師がシリンジに採取

メトレキサート 10mg + 生理食塩液 4ml / 髄注

※5mlのシリンジを使用して調製

生理食塩液 3ml / フラッシュ・髄注
※医師がシリンジに採取