

尿路上皮癌

カルボプラチン+ゲムシタビン療法

1kur=3週

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5
ゲムシタビン	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
			Day1,8

Day1 イメンドカプセル(125) 1カプセル CBDCA投与1時間前に内服

Day2,3 イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 30min
- Y ③ ゲムシタビン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min
副作用増強の恐れがあるため60分以内で投与
- Y ④ カルボプラチン ()mg + 生理食塩液 250ml / 1hr
- ⑤ 生理食塩液 100ml / 30min

Day 8

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 30min
- Y ③ ゲムシタビン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ⑤ 生食 100ml 30分でDiv

※ GFR <60ml/min のときこのレジメンを使用。

参考) ゲムシタビンの用量調整

day1, 8	好中球数 >1500/ μ l かつ 血小板数 >10万/ μ l → 100%用量
day8	好中球数 1000-1500/ μ l または 血小板数 7.5万-9.9万/ μ l → 75%用量