

TIP療法 3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
パクリタキセル	PTX	パクリタキセル	210 mg/m ²	Day1
イフォスファミド	IFM	イホマイド	1200 mg/m ²	Day2~6
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	20 mg/m ²	Day2~6
メスナ		ウロミテキサン	イフォスファミドの20%	Day2~6

Day2 | イメンドカプセル(125) 1カプセル シスプラチン投与1時間~1時間30分前に内服
 Day3~6 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

- ① 生理食塩液 250ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 2A
 + ラニチジン(50mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 2.5V / 30min
- Y ③

パクリタキセル ()mg + 生理食塩液 500ml / 3hr

 インラインフィルター付ルート使用
 滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節
- ④ 生理食塩液 50ml / 10分 (フラッシュ)
 (へパロック)

Day2

- ① ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- Y ②

イホマイド ()mg + 生理食塩液 500ml / 90min

- ③ ウロミテキサン注 ()mg / 静注 (イフォスファミド投与終了直後)
- ④ ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑤ アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 2.5V
 + 生理食塩液 100ml / 30min
- ⑥ 生理食塩液 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min
- ⑦ ウロミテキサン注 ()mg / 静注 (イフォスファミド投与終了4時間後)
- ⑧ マンニトール 300ml / 30min
- Y ⑨

シスプラチン ()mg + 生理食塩液 500ml / 2hr

- ⑩ 生理食塩液 500ml / 60min
- ⑪ 生理食塩液 500ml / 60min
- ⑫ ウロミテキサン注 ()mg / 静注 (イフォスファミド投与終了8時間後)
 (へパロック)

Day3~6

① ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min

Y ②

イホマイド ()mg + 生理食塩液 500ml / 90min

③ ウロミテキサン注 ()mg / 静注 (イフォスファミド投与終了直後)

④ ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min

⑤ デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

生理食塩液 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min

⑥ ウロミテキサン注 ()mg / 静注 (イフォスファミド投与終了4時間後)

⑦ マンニトール 300ml / 30min

⑧

シスプラチン ()mg + 生理食塩液 500ml / 2hr

Y ⑨ 生理食塩液 500ml / 60min

⑩ 生理食塩液 500ml / 60min

⑪ ウロミテキサン注 ()mg / 静注 (イフォスファミド投与終了8時間後)

⑫ (ヘパロック)