

ハチ (スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチ)

ハチは、自然界では花の受粉をし、ケムシなどを食べる益虫です。

ハチは、むやみに人を刺すことはありません。

ハチは、巣を守ろうとして人を刺します。

生活に支障がない場所にあるハチの巣は、刺激せず、静かに様子を見ましょう。

アシナガバチ・スズメバチの巣の命は、1年限りです。


冬には巣は空っぽになり、再び使われることはありません。

駆除を必要とする場合は、巣がある場所の所有者・管理者が対応してください。

巣を作りやすい場所

春頃からハチの活動が始まり、軒下や樹木など雨風をしのげる場所に巣を作ります。初期の段階であれば、比較的容易に駆除することができます。

日頃から、軒下・庭木・植え込み・戸袋の中など家の周辺を点検しましょう。



家の周りにできたハチの巣


樹木



みかんの木にスズメバチの巣
(ベランダから撮影)
(宮前区野川・7月)

植え込み

つつじにスズメバチの巣
(宮前区菅生・5月)



軒下

2階軒下にアシナガバチの巣
(宮前区犬蔵・9月)



普段開閉しない窓



窓枠に
アシナガバチの巣
(宮前区宮前平・10月)

戸袋の下



2階の戸袋にアシナガバチの巣
(宮前区宮崎・9月)

テラス



テラスにスズメバチの巣
(宮前区鷺沼・5月)

裏の物置



裏の物置にスズメバチの巣
(宮前区五所塚・9月)

ハチの巣の見分け方と対処方法

■ スズメバチ

● 巣の特徴

- ・独特なしま模様があり、巣穴が1つ。
- ・初期の巣は、5~10 cmのトックリを逆さまにした形(コガタスズメバチ)またはボール型。
- ・全盛期の夏から秋にかけての巣は、大きなボール型。
- ・コガタスズメバチのトックリ型も、首の部分が切り取られ、ボール型になります。



スズメバチ
(宮前区宮前平・5月)

● 対処方法

- ・ケムシなどを食べて、樹木の害虫駆除をしてくれる益虫です。しかし、巣を守る本能が非常に強いため、興奮すると集団で人を攻撃します。スズメバチの巣を見かけたら、巣から離れ、刺激しないようにしてください。
- ・個人で巣を取り除くことができない場合は、専門業者にまかせた方がよいでしょう。保健福祉センターでは駆除業者の協会（有料）を紹介しています。

※調査の結果、営巣場所が公共的な場所で、危険性が高いと判断した場合、行政で対処することがあります。



庭木にスズメバチ初期の巣(宮前区白幡台・5月)



物置にスズメバチ全盛期の巣(宮前区五所塚・9月)

■ アシナガバチ

● 巣の特徴

- ・おわんを逆さにしたような半円形または平たい形。
- ・下から見ると、たくさんの巣穴があります。

● 対処方法

- ・緑を食害する害虫をエサとしている益虫です。
- ・アシナガバチは、スズメバチに比べて攻撃性が弱いです。巣に近づいたり、刺激しなければ人を刺すことはありません。
- ・手を伸ばしても触れることのない高いところの巣など、生活に支障がない場合は、そっとしておきます。
- ・日常生活に支障をきたす場所に巣を作っている場合は、「アシナガバチの巣の駆除方法(P25)」を参考に処置します。
- ・個人で対処できない場合は、駆除業者の協会（有料）を紹介します。



コアシナガバチ
(宮前区初山
・7月)





軒下にアシナガバチ初期の巣(宮前区初山・7月)



戸袋にアシナガバチ全盛期の巣(宮前区宮崎・9月)

■ ミツバチ

● 巣の特徴

- ・白いう状で平たい形が多いです。

● 巣と間違ふハチの固まり(分封)

- ・春から初夏の晴れた日に、庭木などに突然ハチの固まりが現れ、人を驚かせることがあります。これは、分封（ぶんぽう）といいます。
- ・女王バチが、新女王バチの誕生直前に働きバチの半数を連れて、新しい巣を作る場所を探しているのです。

● 対処方法

【巣の場合】

- ・場所によっては、専門業者による駆除が必要です。

【分封の場合】

- ・分封中のハチはおとなしく、刺される心配はほとんどありません。
- ・1～数日で移動します。
刺激せずに、そっとしておきます。
- ・心配な場合は、駆除業者の協会（有料）を紹介します。



ミツバチの分封(宮前区菅生・5月)

アシナガバチの巣の駆除方法

アシナガバチの巣の駆除を行う時は、次の事項に注意して実施してください。

1 ハチの巣の確認

日中の明るいうちに、巣の場所・大きさを確認します。

2 殺虫剤の準備

ハチ専用のスプレー式殺虫剤を用意します。

3 服装

長そで・長ズボン・帽子・手袋・長靴を着用し、首にタオルを巻きます。黒っぽいものは、敵と思って攻撃してきます。白っぽい服装にします。

4 実施時期

日没後 2～3 時間後、ハチが巣に戻っている時に駆除します。
ハチは、夜間には飛びません。

5 駆除方法

巣から 1～2m 離れた風上側から殺虫剤を十分噴霧します。
殺虫剤を噴霧すると、ハチが飛び散りますが、これは攻撃ではありません。
殺虫剤が数秒でも体に付着すると、ハチは攻撃性がほとんどなくなり、死にます。
驚いて、作業を中断せず、巣に向かって噴霧を続けます。
懐中電灯を使用する場合は、直接、灯りを当てないようにします。

6 後片付け

殺虫剤噴霧後、しばらく様子を見てから、棒などで巣の根元から落とします。
地上に落ちたハチの死骸は、ほうきで掃き集めます。
反射的に刺す場合があるので、素手で触らないでください。
巣とハチの死骸は、ビニール袋に入れもう一度殺虫剤を噴霧し、密封して捨てます。

防護服の貸し出し

- ・保健福祉センターでは、防護服を無料で貸し出しています。
- ・数に限りがあります。
あらかじめ、電話予約をしてから来所してください。
- ・貸し出し期間は、3 日間です。



ハチに刺されないために

巣

巣に近づかない。突ついたり、刺激したりしない。



服装

黒色に対し攻撃性が高いので、野外で活動するときは、黒い服装を避け、帽子をかぶるなど頭髪を隠します。（白色・銀色に対する攻撃性は低いです。）

におい

ハチはにおいにより刺激され、興奮します。野外で活動するときは、ヘアスプレー・香水などをつけるのは、なるべくやめましょう。

動き

ハチは速く動くものに興味を持ちます。手で払ったりすると逆に攻撃してきます。巣を見つかけたり、ハチが近づいてきたりした場合、急な動きはしないで、ゆっくり離れます。

洗濯物

戸外に干した洗濯物や布団を取り込む前に、ハチが紛れ込んでいないか点検します。

こんなときはどうする？

巣以外の場所で単独行動しているハチは、たたいたり追いかけて回したり、刺激しない限りは積極的に攻撃してきません。落ち着いて対処しましょう。

【車の中に入ってきたとき】

慌てず車を止め、明るい側の窓を開けてハチが出て行くのを待ちます。

【家に入ってきたとき】

明るい方角の窓や戸を開けてハチが出て行くのを待ちます。



ハチに刺されたら

- ・ 応急処置として、刺された部位を流水でよく洗い流し、手で毒液を搾り出し、氷で冷やします。そして、抗ヒスタミン軟膏を塗ります。
- ・ 応急処置後、速やかに医療機関を受診しましょう。



2回刺されると危ない？

- ・ ハチ毒アレルギーを持つ人は、過去に刺された時に体内にできた抗体が、2度目に入ったハチ毒に過剰に反応するため、急激なアレルギーショックを起こす可能性があります。
- ・ ショック症状は、刺されて1時間以内に発現することが多いです。全身の蕁麻疹・めまい・意識がもうろうとする・呼吸困難などの症状が現れたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
- ・ ハチ毒アレルギーを持つ人は、ごく一部です。全ての人ではありません。

スズメバチの巣の中は…

平成 20 年 5 月下旬、宮前区白幡台の I さんから、庭木にトックリ型の巣があると相談の連絡をいただきました。直ちに現地を確認したところ、トックリを逆さまにしたコガタスズメバチ独特の巣がありました。初期の巣では、女王バチ 1 匹が最初の働きバチが羽化するまで巣を作りながら子育てすること、全盛期に比べて駆除は比較的容易であることを説明しました。結局、I さんのご主人が自ら駆除しました。駆除された後、巣の中を見てもみませんか、と連絡をいただきました。女王バチ・幼虫・卵を確認することができました。米粒のようなものが、卵です。

I さん、ありがとうございました。

巣の様子は P23



7月。宮前区初山の住宅でアシナガバチの巣を発見。巣は約 10 cm。巣の成長を観察することにしました。

巣の様子は P24

①アシナガバチの食事は…



巣に働きバチが群がっています。働きバチは緑色の小さな玉を口にくわえています。これは、毛虫を捕らえ肉団子にしたもの。働きバチはせっせと幼虫に肉団子を与えていました。

②残念ながら…

巣を発見してから数週間頃、働きバチの数が減ってきた…どうしたのかな？とっているとある日、巣に大きなハチがいるのを発見。スズメバチです！アシナガバチたちはスズメバチに襲われてしまいました…。

