

結核は過去の病気ではありません ~高齢者施設むけ結核基礎知識~

「感染」と「発病」は違います

「感染」とは

結核菌が体内に入り、それに対する身体の反応が起こっている状態です。体の免疫で菌の活動は抑え込まれています。

「発病」とは

結核菌の活動により発熱や咳、胸部X線写真に影が出るなどの症状が出現した状態で、治療を要します。病状が進行して、痰の中に菌が排出される（「排菌」＝感染性が高い）ようになると、人にうつす可能性も出てきます。

※感染しているだけで発病していないければ人にうつすことはありません。

結核はどんな症状？

結核の症状は風邪によく似ていますが、2週間以上続く咳や痰、微熱・身体のだるさ、体重減少などがあります。

数年以上に渡り胸部X線検査の実施機会がないと、本人の気づかない間に病気が進行し、「排菌」する状態になってから診断に至ることがあります。



結核の治療

原則として6か月以上、複数の抗生物質を内服します。排菌していないければ、入院せず、外来（在宅や施設）で治療ができます。



※感染のみで発病していない状態（潜在性結核感染症）でも、発病予防のために内服治療を行う場合があります。

結核患者はどの位いるの？

令和4年には国内で新たに 10,235人（川崎市 127 人、中原区 16 人）が患者として登録されています。中原区では人口増加傾向が続いているが、結核患者数はここ数年減少してきています。

全国的にも結核罹患率（人口 10 万対患者数）が減少しています（全国 8.2、川崎市 8.2、中原区 6.1）。

そのため、結核という病気になじみのない方が増えていますが、高齢者は日本で結核がまん延していた時代に幼少期を過ごしており、既に結核菌に感染している人が多く、加齢や基礎疾患によって免疫力が低下すると結核を発病する人が多いのです。

令和4年では全患者数のうち 70 歳以上の方が 65% を占めています。

早期発見のために

日常的な健康観察

高齢者結核では、咳などの呼吸器症状がはっきりとあらわれない場合があります。

- ◇食欲がなくなった
- ◇体重が減ってきた
- ◇元気がない、歩けなくなった等の症状が見られることがあります。



定期的な健康診断

症状が出る前に胸部X線検査で異常が見つかることがあります。

施設健診等の機会を活用しましょう。

利用開始時のチェックポイント

- ・「高齢者は結核のハイリスク者」です。
2週間以上続く呼吸器症状（咳、痰など）や胸部X線所見で異常があれば、施設医等に相談しましょう。
- ・結核等の既往歴や治療中の病気を確認しましょう。

接触者健診について

結核患者が出た時、保健所は必要に応じて接触者の健診を実施します。

医療機関

- ・結核の診断
- ・保健所への届出（直ちに）

保健所

- ・患者、施設、医療機関等から情報収集
- ・健診対象者の選定

患者との接触時間、接触度合い、感染した場合の発病リスク等から判断し、選定

- ・健診の実施

【血液検査】結核の感染を調べる

【胸部X線検査】結核の発病を調べる

※健診の内容や実施時期は対象者により異なります。

急いで検査をしても正確な結果が得られないことがあります。

利用者や職員に結核患者が出たら、保健所にご相談ください。

施設職員皆さまの健康が大切

体調不良時は早めの受診を

高齢者介護に関わる“あなた”と、“あなたの大切な人”的健康を守るために、日頃から身体の免疫力を維持する健康管理が重要です。

風邪等の症状がある時は無理せず早めの受診と休養を。

職員の定期健康診断

高齢者・障害者福祉施設等は、集団感染が起こりやすい場です。利用者だけでなく職員の方も、年に1回の定期検診で胸部X線検査を受けてください。

