

吸う人にももちろん リスクがあります



喫煙者のリスク

たばこを吸うことによる健康被害には、煙が直接触れる口や喉、肺の影響だけではなく、これまでの観察研究などによる総合的な判断によって、**がん・循環器・呼吸器、妊婦**への影響といった広範囲な健康影響が喫煙により引き起こされることが知られるようになりました。

吸わない人に比べ吸う人の
がん・循環器病、死亡リスク



がん全体	1.6倍
食道がん	3.7倍
胃がん	1.7倍
大腸がん	1.4倍
膵がん	1.8倍
肺がん	4.5倍

循環器病のリスク

脳卒中	1.3倍
虚血性心疾患	2.9倍



がん全体	1.5倍
肺がん	4.2倍
乳がん	1.9倍
乳がん（閉経前）	3.9倍

循環器病のリスク

脳卒中	2.0倍
虚血性心疾患	3.0倍

引用:国立がん研究センター「多目的コホート研究の成果2016年12月」

川崎市の喫煙状況

令和4年度の調査結果では、川崎市民の喫煙率は全体で12.1%でした。特に喫煙率が高かったのは男性の40代～60代の**子育て世代**や**働き盛り世代**であり、約4人に1人が喫煙をしています。
また、近年普及している**加熱式たばこ**の喫煙率は、喫煙者全体のうち約3割であり、特に20代～40代の約4割以上が加熱式たばこを吸っています。

CHECK 加熱式たばこについて

たばこの葉またはその加工品を加熱して発生する蒸気を吸引するたばこ製品です。
加熱式たばこの主流煙にはニコチンを含む有害物質が含まれます。
紙巻たばこに比べて健康影響が少ないかどうかは、まだ明らかになっていません。



たばこをやめたくてもやめられないあなたへ
主な禁煙方法をご紹介します



禁煙外来




こちらの二次元コード
からも検索できます



たばこをやめたい人のために設けられた専門外来です。カウンセリングや生活指導といった禁煙サポートや、ニコチンガム・ニコチンパッチを使用したニコチン置換療法などによる禁煙治療が行われます。
禁煙外来を実施している医療機関は、「医療情報ネット（ナビイ）」で検索できます。キーワード検索で「禁煙外来」と検索してください。

禁煙グッズ



禁煙パイプや禁煙胎など口寂しさを軽減する手軽なものから、ニコチンガムやニコチンパッチなどの禁煙補助剤なども含まれます。また、喫煙の習慣から離れるため、あめ、水、手もみグッズなど、色々なものがあります。



KAWASAKI CITY

【お問い合わせ先】 川崎市健康福祉局保健医療政策部健康増進担当 TEL:044-200-0155

令和6年10月