


施設向け 令和4年5月
感染対策レター 第16号

川崎市保健所 感染症対策担当 編

TEL : 044 - 200-2342
Email:40kansen@city.kawasaki.jp

新型コロナウイルス感染者数は増加する？

今年のゴールデンウィークは、全国で人出が増加しました。5月8日の川崎市の陽性者数は前週から約2倍増加しています。今後、年始のように増加していくのかは不明ですが、予防策は今までと変わりません。連休明けに、かぜのような体調不良の職員・従事者は、早めに検査を受け「感染なし」「体調の回復」を確認するまで出勤を控えましょう。



厚生労働省からの情報提供

高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について

4月27日付、厚生労働省から上記の事務連絡が通知されています。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000934106.pdf>



介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について


濃厚接触者となった介護従事者が、要件及び注意事項を満たす限りにおいて、介護に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取扱いも可能とする旨が、3月16日厚労省から事務連絡が通知されています。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000914003.pdf>



川崎市の新型コロナワクチン接種状況

3回目(追加)接種率(5月8日現在)



※11月30日までに2回目接種を受けた人を分母とし、接種率を算出



65歳以上は接種率が高いね。若い人の接種率も少しずつ上がっているよ。

新型コロナワクチンの効果は？

<オミクロン株に対する発症予防効果>

オミクロン株に対する発症予防効果は、2~4週間後は65~70%が25週後には10%程度に低下することが示されています。追加接種により一時的に効果が回復しますが、15週後以降には25~40%になるというデータもあります。

<オミクロン株に対する入院予防効果>

2回接種後25週目以降では44%が追加接種後2~4週間目は92%、10週以降で83%であったことが報告されています。65歳以上の人に対しても追加接種後10週以降で89%であったことが報告されています。ワクチンの入院予防効果は保たれています。


厚生労働省ホームページ

英国健康安全保障庁(UKHSА publications gateway number GOV-10924)の報告より

基本的な感染対策を見直そう

飛沫予防策は正しいマスクの着用と目を保護するゴーグルです。

- 鼻からあごの下まですっぽり覆っていますか。
- 近くでケアする際にはお互いマスクを着用していますか。
- 利用者がマスクを着用していない場面(食事介助や吸引、口腔ケア時)などはゴーグルもしくはフェースシールドを着用していますか。



接触予防策は手指衛生・手袋・ガウン着用です。

- 4つの瞬間に手指衛生を実施していますか。
- 血液・体液に触れる可能性のあるケア時は手袋・ガウンを着用していますか。
- 正しく手袋を使用していますか。(感染対策レター第5号を見てね)