

新型コロナワクチン定期接種で使用する各ワクチンの特性一覧

ワクチンメーカー	ファイザー株式会社	モデルナ・ジャパン株式会社	第一三共株式会社	武田薬品工業株式会社	Meiji Seikaファルマ株式会社
販売名	コミナティ筋注シリーズ 12歳以上用	スパイクバックス筋注	ダイチロナ筋注	ヌバキソビッド筋注 1mL	コスタイベ筋注用
抗原株	SARS-CoV-2 オミクロン株 JN.1 系統				
種別 (モダリティ)	mRNA	mRNA	mRNA	組換えタンパク	mRNA (レプリコン)
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防				
用法・用量	1回 0.3mL を筋肉内に接種する。	1回 0.5mL を筋肉内に接種する。	1回 0.6mL を筋肉内に接種する。	1回 0.5mL を筋肉内に接種する。	本剤を日局生理食塩液 10mL にて溶解する。1回 0.5mL を筋肉内に接種する。
接種間隔	通常、前回の SARS-CoV-2 ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後	通常、前回の SARS-CoV-2 ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後	通常、前回の SARS-CoV-2 ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後	通常、前回の SARS-CoV-2 ワクチンの接種から少なくとも6か月経過した後	通常、前回の SARS-CoV-2 ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後