

2023年11月1日時点の情報です
(今後、国の方針等に変更があった場合は、内容に変更が生じる可能性があります。)

初回接種を完了した12歳以上の方向け

令和5（2023）年度 新型コロナワクチン接種のお知らせ



令和5（2023）年度の接種について

接種にかかる費用について

令和5年秋開始接種期間中は引き続き、**自己負担なし**で接種いただけます。

接種の対象となる方について

令和5年秋開始接種 実施期間：9月20日～令和6年3月31日

初回接種（2回目までの接種※）を完了した生後6か月以上の方

※ 5歳未満で1回目の接種を受けた場合は3回目までの接種

- * これまでの追加接種の有無・回数に関わらず、初回接種を完了した生後6か月以上の全ての方が対象です。
- * 令和5年秋開始接種期間中に**1人1回接種**できます。
- * 令和5年秋開始接種は**令和6年3月31日**で終了予定、**令和6年度の接種については未定**です。

使用するワクチンと接種間隔について

使用するワクチン		接種間隔
オミクロン株対応ワクチン (1価ワクチン)	ファイザー社製 XBB	前回の接種から 3か月以上
	モデルナ社製 XBB	
従来型ワクチン (1価ワクチン)	武田社製 (ノババックス)	前回の接種から 6か月以上

- * 接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することとなります。
- ※**実施期間、対象者、使用するワクチン等**について今後、国の方針により**変更となる場合があります**。また、最新のワクチン説明書は、国ホームページへ掲出される予定です。最新情報については市ホームページ等で必ずご確認ください。

市ホームページや最新のワクチン説明書などはコチラ

接種に関するご相談については、予約コールセンター
電話番号:0120-654-478 でお問合せを受け付けています。



[市ホームページ]



[最新のワクチン説明書など]

接種場所と予約について

同封の接種医療機関一覧や市ホームページなどで、接種場所を探すことができます。

各接種場所の 予約について

- ・医療機関によって、予約サイト、予約コールセンター又は独自の方法で予約を受け付けています。
- ・かかりつけ医療機関のある方は、通院などの際に、ワクチン接種に関してご相談ください。


- (1) 予約サイトでの予約（予約にはメールアドレスの登録が必要です。）
受付時間：24時間（メンテナンスのために一時的に停止する場合があります。）

URL ▶ <https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki/>



[予約サイト]

- (2) 予約コールセンターでの予約
受付時間：8時30分から18時まで（土日祝日対応）※12月29日～1月3日を除く

電話番号：  **0120-654-478**

必要な接種間隔をおかないと接種を受けられませんので、必ず前回の接種日を確認した上で予約をお取りください。 ※裏面の接種日早見表を参考にしてください。

接種について

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

(12歳～15歳の方の接種については保護者の同意が必要です。)

- ・ワクチンを受ける際には、効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。また、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。
- ・12歳～15歳の方の接種については、原則、保護者の同伴・同意が必要です。接種を希望する場合、予診票の署名欄に、保護者の氏名を署名してください。署名がなければ予防接種は受けられません。その他、詳しくは市ホームページをご確認ください。

今回のワクチン接種には「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法上のいわゆる「努力義務」が適用されています。接種は強制ではなく、ご本人（保護者）が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、令和5年9月20日以降の接種においては、「努力義務」は65歳以上の高齢者と基礎疾患をお持ちの方等に適用され、それ以外の方には適用されません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチン接種日早見表（接種間隔が3か月以上の場合）

前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)	前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)	前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)
2023年9月1日	⇒ 2023年12月1日	2023年9月13日	⇒ 2023年12月13日	2023年9月25日	⇒ 2023年12月25日
2023年9月2日	⇒ 2023年12月2日	2023年9月14日	⇒ 2023年12月14日	2023年9月26日	⇒ 2023年12月26日
2023年9月3日	⇒ 2023年12月3日	2023年9月15日	⇒ 2023年12月15日	2023年9月27日	⇒ 2023年12月27日
2023年9月4日	⇒ 2023年12月4日	2023年9月16日	⇒ 2023年12月16日	2023年9月28日	⇒ 2023年12月28日
2023年9月5日	⇒ 2023年12月5日	2023年9月17日	⇒ 2023年12月17日	2023年9月29日	⇒ 2023年12月29日
2023年9月6日	⇒ 2023年12月6日	2023年9月18日	⇒ 2023年12月18日	2023年9月30日	⇒ 2023年12月30日
2023年9月7日	⇒ 2023年12月7日	2023年9月19日	⇒ 2023年12月19日	2023年10月1日	⇒ 2024年1月1日
2023年9月8日	⇒ 2023年12月8日	2023年9月20日	⇒ 2023年12月20日	2023年10月2日	⇒ 2024年1月2日
2023年9月9日	⇒ 2023年12月9日	2023年9月21日	⇒ 2023年12月21日	2023年10月3日	⇒ 2024年1月3日
2023年9月10日	⇒ 2023年12月10日	2023年9月22日	⇒ 2023年12月22日	2023年10月4日	⇒ 2024年1月4日
2023年9月11日	⇒ 2023年12月11日	2023年9月23日	⇒ 2023年12月23日	2023年10月5日	⇒ 2024年1月5日
2023年9月12日	⇒ 2023年12月12日	2023年9月24日	⇒ 2023年12月24日	2023年10月6日	⇒ 2024年1月6日

お問合せ先

川崎市新型コロナウイルスワクチン予約コールセンター

電話番号： 0120-654-478 FAX 044-953-6339
※耳の不自由な方のお問合せ用

受付時間：8時30分から18時まで（土日祝日対応・12月29日～1月3日を除く）

- ・接種予約に関するお問合せ
- ・接種券に関するお問合せ
- ・接種証明書に関するお問合せ
- ・新型コロナワクチン接種に関するご相談
- ・接種後の副反応に関するご相談
- など

ファイザー社
1 価ワクチン用
(XBB.1.5)
(2023 年 9 月)

新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (追加接種 (令和 5 年秋開始接種用))

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは、ファイザー社製のオミクロン株対応 1 価ワクチン (オミクロン株 XBB.1.5) です。新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として接種します。

オミクロン株対応 2 価ワクチン (従来株/BA.1 又は BA.4-5) の臨床試験で中和抗体価の上昇や有効性が確認されていること、非臨床試験からヒトでの免疫応答の予測が可能と確認されたことを踏まえ、非臨床試験における本ワクチンの追加接種により XBB.1.5 に対する中和抗体の産生が認められたことから、有効性が期待できるとされています。

販売名	コミナティ RTU 筋注 (1 価 : オミクロン株 XBB.1.5)
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	1 回 (前回の接種が完了してから 3 か月以上が経過した後) ※筋肉内に接種
接種対象	初回 (1・2 回目) 接種を完了した 12 歳以上の方
接種量	1 回 0.3 mL を 1 回

- 本ワクチンは、前回までの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず接種が可能です。
- 本ワクチンの接種を受けても、発症等を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人 (※1)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症 (※2) の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

(※1) 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。前回までの接種でこれらの症状が認められた人は、同一の成分を含むワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中又は妊娠している可能性がある人、授乳している人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。なお、かかりつけの産婦人科医に確認していない場合でも、予診医によりワクチン接種が可能と判断された場合は、接種が可能です。

過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

(うらへ続く)

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすることができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2（オミクロン株 XBB.1.5）のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ ラクストジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 のスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジール〕ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (追加接種 (令和 5 年秋開始接種) 用)

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは、モデルナ社製のオミクロン株対応 1 価ワクチン (オミクロン株 XBB.1.5) です。新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として接種します。

オミクロン株対応 2 価ワクチン (従来株/BA.1 又は BA.4-5) の臨床試験で中和抗体価の上昇や有効性が確認されていること、非臨床試験からヒトでの免疫応答の予測が可能と確認されていることを踏まえ、非臨床試験における本ワクチンの追加接種により XBB.1.5 に対する中和抗体の産生が認められたことから、有効性が期待できるとされています。

販売名	スパイクバックス™筋注 (1 価: オミクロン株 XBB.1.5)
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	1 回 (前回の接種が完了してから 3 か月以上が経過した後) ※筋肉内に接種
接種対象	初回 (1・2 回目) 接種を完了した 12 歳以上の方
接種量	1 回 0.5 mL を 1 回

- 本ワクチンの接種は、前回までの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず可能です。
- 本ワクチンの接種を受けても、発症等を完全には予防できないため、引き続き、適切な感染防止策が必要です。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人 (※1)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症 (※2) の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

(※1) 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。前回までの接種でこれらの症状が認められた人は、同一の成分を含むワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中又は妊娠している可能性がある人、授乳している人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。なお、かかりつけの産婦人科医に確認していない場合でも、予診医によりワクチン接種が可能と判断された場合は、接種が可能です。

過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

(うらへ続く)

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（モデルナ社製のオミクロン株対応 1 価ワクチン（XBB.1.5））の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2（オミクロン株 XBB.1.5）のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ アンデュソメラン（オミクロン株 XBB.1.5 のスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ SM-102：ヘプタデカン-9-イル 8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)オクタン酸エステル ◇ コレステロール ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ 1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン（PEG2000-DMG） ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩 ◇ 氷酢酸 ◇ 酢酸ナトリウム水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

【高津区】

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Takatsu-ku such as 久地さよ医院, 是井クリニック, 松岡クリニック, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Takatsu-ku such as 伊藤医院, 洲之内内科, 総合高津中央病院, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Takatsu-ku such as 千年診療所, 野川整形外科, 成宮医院, etc.

【宮前区】

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Miyamae-ku such as 宮前平グリーンハイツ診療所, どんぐりクリニック, ニコット子どもクリニック, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Miyamae-ku such as 丸田クリニック, 原クリニック, 蛸沼透光診療所, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Miyamae-ku such as 本村医院, 佐治医院, みやびクリニック, etc.

【多摩区】

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Tama-ku such as 高橋クリニック, 遊辺小児科医院, 石田整形外科, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Tama-ku such as 生田病院, 多摩島たきぐち耳鼻咽喉科, 藤田クリニック, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Tama-ku such as 戸倉なかに消化器・泌尿器科, 多摩区中野島3-13-8, etc.

【麻生区】

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Aoi-ku such as はるひ野内科クリニック, はるひ野整形外科, たま日吉台病院, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Aoi-ku such as クロキ形成外科クリニック, かじもと耳鼻咽喉科, 新百合ヶ丘ステーションクリニック, etc.

Table with 3 columns: 医療機関名, 住所, 電話番号. Lists medical facilities in Aoi-ku such as リスホームケアクリニック, 藤井内科医院, みねき内科クリニック, etc.

令和5（2023）年度 新型コロナワクチン接種のお知らせ



令和5（2023）年度の接種について

接種にかかる費用について

令和5年秋開始接種期間中は引き続き、**自己負担なし**で接種いただけます。

接種の対象となる方について

令和5年秋開始接種 実施期間：令和5年9月20日～令和6年3月31日

初回接種（2回目までの接種※）を完了した生後6か月以上の方

※5歳未満で1回目の接種（ファイザー社製ワクチン）を受けた場合は3回目までの接種

- * これまでの追加接種の有無・回数に関わらず、初回接種を完了した生後6か月以上の全ての方が対象です。
- * 令和5年秋開始接種期間中に1人1回接種できます。
- * 令和5年秋開始接種は**令和6年3月31日で終了**予定、**令和6年度の接種については未定**です。

使用するワクチンと接種間隔について

使用するワクチン		接種間隔
オミクロンXBB対応 1価ワクチン	ファイザー社製	前回の接種から 3か月以上
	モデルナ社製	

- * 接種を受ける時期に供給されているワクチンを、年齢に応じて接種することとなります。
- * モデルナ社製ワクチンは6歳以上で接種できます。

※**実施期間、対象者、使用するワクチン等**について今後、国の方針により**変更となる場合があります**。また、最新のワクチン説明書は、国ホームページへ掲出される予定です。最新情報については市ホームページ等で必ずご確認ください。

市ホームページや最新のワクチン説明書などは**コチラ**

接種に関するご相談については、予約コールセンター
電話番号:0120-654-478 でお問合せを受け付けています。



[市ホームページ]



[最新のワクチン説明書など]

接種場所と予約について

市ホームページの医療機関一覧などで、接種場所を探すことができます。

各接種場所の 予約について

- ・医療機関によって、予約サイト、予約コールセンター又は独自の方法で予約を受け付けています。
- ・かかりつけ医療機関のある方は、通院などの際に、ワクチン接種に関してご相談ください。

- (1) 予約サイトでの予約（予約にはメールアドレスの登録が必要です。）
受付時間：24時間（メンテナンスのために一時的に停止する場合があります。）

URL <https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki/>



[予約サイト]

- (2) 予約コールセンターでの予約
受付時間：8時30分から18時まで（土日祝日対応）※12月29日～1月3日を除く

電話番号： **0120-654-478**

必要な接種間隔をおかないと接種を受けられませんので、必ず前回の接種日を確認した上で予約をお取りください。 ※裏面の接種日早見表を参考にしてください。

接種について

◎ ワクチンを受けるには保護者の方の同意と立ち会いが必要です。

ワクチンを受ける際には、効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。また、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

今回のワクチン接種には「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法上のいわゆる「努力義務」が適用されています。接種は強制ではなく、保護者が納得した上で接種をご判断いただくことになります。なお、令和5年9月20日以降の接種においては、「努力義務」は65歳以上の高齢者と基礎疾患をお持ちの方等に適用され、それ以外の方には適用されません。

当日の持ち物

- ・接種券（シールは剥がさず台紙ごと接種場所までご持参ください。）
- ・予診票（事前にご記入の上、ご持参ください。）
- ・母子健康手帳
- ・本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証など）

※ 封筒には、「接種券兼予防接種済証」と「予診票」が同封されています。紛失しないよう大切に保管ください。

※ 接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱（37.5度以上）がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約を取り直してください。

※ 上腕にワクチンを接種しますので、速やかに肩を出せる服装でお越しください。

※ ワクチン接種前には、十分な睡眠と食事・水分をとって体調を整えて接種場所へお越しください。



封筒の中身一式



母子健康手帳

◎ 予防接種健康被害救済制度があります。


予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチン接種日早見表（接種間隔が3か月以上の場合）

前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)	前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)	前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)
2023年9月1日	⇒ 2023年12月1日	2023年9月13日	⇒ 2023年12月13日	2023年9月25日	⇒ 2023年12月25日
2023年9月2日	⇒ 2023年12月2日	2023年9月14日	⇒ 2023年12月14日	2023年9月26日	⇒ 2023年12月26日
2023年9月3日	⇒ 2023年12月3日	2023年9月15日	⇒ 2023年12月15日	2023年9月27日	⇒ 2023年12月27日
2023年9月4日	⇒ 2023年12月4日	2023年9月16日	⇒ 2023年12月16日	2023年9月28日	⇒ 2023年12月28日
2023年9月5日	⇒ 2023年12月5日	2023年9月17日	⇒ 2023年12月17日	2023年9月29日	⇒ 2023年12月29日
2023年9月6日	⇒ 2023年12月6日	2023年9月18日	⇒ 2023年12月18日	2023年9月30日	⇒ 2023年12月30日
2023年9月7日	⇒ 2023年12月7日	2023年9月19日	⇒ 2023年12月19日	2023年10月1日	⇒ 2024年1月1日
2023年9月8日	⇒ 2023年12月8日	2023年9月20日	⇒ 2023年12月20日	2023年10月2日	⇒ 2024年1月2日
2023年9月9日	⇒ 2023年12月9日	2023年9月21日	⇒ 2023年12月21日	2023年10月3日	⇒ 2024年1月3日
2023年9月10日	⇒ 2023年12月10日	2023年9月22日	⇒ 2023年12月22日	2023年10月4日	⇒ 2024年1月4日
2023年9月11日	⇒ 2023年12月11日	2023年9月23日	⇒ 2023年12月23日	2023年10月5日	⇒ 2024年1月5日
2023年9月12日	⇒ 2023年12月12日	2023年9月24日	⇒ 2023年12月24日	2023年10月6日	⇒ 2024年1月6日

お問合せ先

川崎市新型コロナウイルスワクチン予約コールセンター

電話番号：  **0120-654-478** FAX 044-953-6339
※耳の不自由な方のお問合せ用

受付時間：8時30分から18時まで（土日祝日対応・12月29日～1月3日を除く）

- ・接種予約に関するお問合せ
- ・接種券に関するお問合せ
- ・接種証明書に関するお問合せ
- ・新型コロナワクチン接種に関するご相談
- ・接種後の副反応に関するご相談
- など

<5~11 歳のお子様の保護者の方へ>
新型コロナワクチン予防接種についての説明書
(小児 (5~11 歳) 追加接種 (令和 5 年秋開始接種用))

新型コロナワクチンの接種対象となっている 5~11 歳のお子様の保護者の方へ

- ◎ ワクチン接種には、**保護者の同意と立ち合いが必要です。**
- ◎ **接種を希望する場合、予診票の署名欄に、保護者の氏名を記入してください。**接種を希望されない場合には、署名欄には何も記載しないでください。**予診票に保護者の署名がなければ、予防接種はできません。**
- ◎ 疑問などがあれば、あらかじめ、国や市町村からの情報をご覧くださいか、かかりつけの医師などによく相談いただき、接種のご判断をお願いします。

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは、ファイザー社製の小児用オミクロン株対応 1 価ワクチン (オミクロン株 XBB.1.5) です。新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として接種します。

オミクロン株対応 2 価ワクチン (従来株/BA.1 又は BA.4-5) の臨床試験で中和抗体価の上昇や有効性が確認されていること、非臨床試験からヒトでの免疫応答の予測が可能と確認されていることを踏まえ、非臨床試験における本ワクチンの追加接種により XBB.1.5 に対する中和抗体の産生が認められたことから、有効性が期待できるとされています。

販売名	コミナティ筋注 5~11 歳用 (1 価: オミクロン株 XBB.1.5)
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	1 回 (前回の接種が完了してから 3 か月以上が経過した後) ※筋肉内に接種
接種対象	初回 (1・2 回目又は 1-3 回目(4 歳以下で受けた場合)) 接種を完了した 5 歳以上 11 歳以下の方
接種量	0.2 mL を 1 回 ※接種する有効成分の量は 10µg (12 歳以上の 3 分の 1)

- 本ワクチンは、前回までの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず接種が可能です。
- 本ワクチンの接種を受けても、発症等を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人 (※1)
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症 (※2) の既往歴のある人
- 重い急性疾患にかかっている人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適切な状態にある人 (※1) 明らかな発熱とは通常 37.5℃ 以上を指します。ただし、37.5℃ を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。前回までの接種でこれらの症状が認められた人は、同一の成分を含むワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

(うらへ続く)

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のオミクロン株対応 1 価ワクチン（5～11 歳用、XBB.1.5））の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2（オミクロン株 XBB.1.5）のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ ラクトジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 のスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ビス（ヘキサノ-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 精製白糖 ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

<6～11歳のお子様の保護者の方へ>
新型コロナワクチン予防接種についての説明書
(小児(6～11歳)追加接種(令和5年秋開始接種用))

新型コロナワクチンの接種対象となっている6～11歳のお子様の保護者の方へ

- ◎ ワクチン接種には、**保護者の同意と立ち合いが必要です。**
- ◎ **接種を希望する場合、予診票の署名欄に、保護者が署名(保護者自身の氏名を記載)してください。**接種を希望されない場合は、署名欄には何も記載しないでください。**予診票に保護者の署名がなければ、接種は受けられません。**
- ◎ 疑問などがあれば、あらかじめ、国や市町村からの情報をご覧くださいか、かかりつけの医師などによくご相談いただき、接種のご判断をお願いします。

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは、モデルナ社製のオミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株XBB.1.5)です。新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として接種します。

オミクロン株対応2価ワクチン(従来株/BA.1又はBA.4-5)の臨床試験で中和抗体価の上昇や有効性が確認されていること、非臨床試験からヒトでの免疫応答の予測が可能と確認されていることを踏まえ、非臨床試験における本ワクチンの追加接種によりXBB.1.5に対する中和抗体の産生が認められたことから、有効性が期待できるとされています。

販売名	スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	1回(前回の接種が完了してから3か月以上が経過した後) ※筋肉内に接種
接種対象	初回(1・2回目)接種を完了した6歳以上11歳以下の方
接種量	1回0.25mLを1回

- 本ワクチンの接種は、前回までの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず可能ですが、初回接種には使えません。
- 本ワクチンの接種を受けても、発症等を完全には予防できないため、引き続き、適切な感染防止策が必要です。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- (※1) 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。前回までの接種でこれらの症状があった人は、同一成分を含むワクチンでの追加接種はできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

(うらへ続く)

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（モデルナ社製のオミクロン株対応 1 価ワクチン（XBB.1.5））の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2（オミクロン株 XBB.1.5）のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ アンデュソメラン（オミクロン株 XBB.1.5 のスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ SM-102：ヘプタデカン-9-イル 8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)オクタン酸エステル ◇ コレステロール ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ 1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン（PEG2000-DMG） ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩 ◇ 氷酢酸 ◇ 酢酸ナトリウム水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

令和5（2023）年度 新型コロナワクチン接種のお知らせ



令和5（2023）年度の接種について

接種にかかる費用について

令和5年秋開始接種期間中は引き続き、**自己負担なし**で接種いただけます。

接種の対象となる方について

令和5年秋開始接種 実施期間：令和5年9月20日～令和6年3月31日

初回接種（3回目までの接種※）を完了した生後6か月以上の方

- ※ モデルナ社製ワクチンを接種した場合は2回目までの接種
- ※ 5歳以上で1回目の接種を受けた場合は2回目までの接種

- * 初回接種を完了した生後6か月以上の全ての方が対象です。
(5歳以上の方は、これまでの追加接種の有無・回数に制限はありません。)
- * 令和5年秋開始接種期間中に1人1回接種できます。
- * 令和5年秋開始接種は令和6年3月31日で終了予定、令和6年度の接種については未定です。

使用するワクチンと接種間隔について

使用するワクチン		接種間隔
オミクロンXBB対応 1価ワクチン	ファイザー社製 (6か月～4歳用ワクチン)	前回の接種から3か月以上

* 初回接種でモデルナ社製ワクチンを接種した方も追加接種はファイザー社製ワクチンの接種になります。

※**実施期間、対象者、使用するワクチン等**について今後、国の方針により**変更となる場合があります**。また、最新のワクチン説明書は、国ホームページへ掲出される予定です。最新情報については市ホームページ等で必ずご確認ください。

市ホームページや最新のワクチン説明書などはコチラ

接種に関するご相談については、予約コールセンター
電話番号:0120-654-478 でお問合せを受け付けています。



[市ホームページ]



[最新のワクチン説明書など]

接種場所と予約について

市ホームページの医療機関一覧などで、接種場所を探すことができます。

各接種場所の 予約について

- ・医療機関によって、予約サイト、予約コールセンター又は独自の方法で予約を受け付けています。
- ・かかりつけ医療機関のある方は、通院などの際に、ワクチン接種に関してご相談ください。

- (1) 予約サイトでの予約（予約にはメールアドレスの登録が必要です。）
受付時間：24時間（メンテナンスのために一時的に停止する場合があります。）

URL <https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki/>



[予約サイト]

- (2) 予約コールセンターでの予約
受付時間：8時30分から18時まで（土日祝日対応）※12月29日～1月3日を除く

電話番号： **0120-654-478**

必要な接種間隔をおかないと接種を受けられませんので、必ず前回の接種日を確認した上で予約をお取りください。 ※裏面の接種日早見表を参考にしてください。

接種について

◎ワクチンを受けるには保護者の方の同意と立ち会いが必要です。

ワクチンを受ける際には、効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。また、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

今回のワクチン接種には「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法上のいわゆる「努力義務」が適用されています。接種は強制ではなく、ご本人（保護者）が納得した上で接種をご判断いただくこととなります。なお、令和5年9月20日以降の接種においては、「努力義務」は65歳以上の高齢者と基礎疾患をお持ちの方等に適用され、それ以外の方には適用されません。

当日の持ち物

- ・接種券（シールは剥がさず台紙ごと接種場所までご持参ください。）
- ・予診票（事前にご記入の上、ご持参ください。）
- ・母子健康手帳
- ・本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証など）

※ 封筒には、「接種券兼予防接種済証」と「予診票」が同封されています。紛失しないよう大切に保管ください。

※ 接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱（37.5度以上）がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約を取り直してください。

※ 上腕（1歳未満は大腿）にワクチンを接種しますので、速やかに接種部位を出せる服装でお越しください。

※ ワクチン接種前には、十分な睡眠と食事・水分をとって体調を整えて接種場所へお越しください。



◎予防接種健康被害救済制度があります。


予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチン接種日早見表（接種間隔が3か月以上の場合）

前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)	前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)	前回の接種日	接種可能となる日 (3か月経過日)
2023年9月1日	⇒ 2023年12月1日	2023年9月13日	⇒ 2023年12月13日	2023年9月25日	⇒ 2023年12月25日
2023年9月2日	⇒ 2023年12月2日	2023年9月14日	⇒ 2023年12月14日	2023年9月26日	⇒ 2023年12月26日
2023年9月3日	⇒ 2023年12月3日	2023年9月15日	⇒ 2023年12月15日	2023年9月27日	⇒ 2023年12月27日
2023年9月4日	⇒ 2023年12月4日	2023年9月16日	⇒ 2023年12月16日	2023年9月28日	⇒ 2023年12月28日
2023年9月5日	⇒ 2023年12月5日	2023年9月17日	⇒ 2023年12月17日	2023年9月29日	⇒ 2023年12月29日
2023年9月6日	⇒ 2023年12月6日	2023年9月18日	⇒ 2023年12月18日	2023年9月30日	⇒ 2023年12月30日
2023年9月7日	⇒ 2023年12月7日	2023年9月19日	⇒ 2023年12月19日	2023年10月1日	⇒ 2024年1月1日
2023年9月8日	⇒ 2023年12月8日	2023年9月20日	⇒ 2023年12月20日	2023年10月2日	⇒ 2024年1月2日
2023年9月9日	⇒ 2023年12月9日	2023年9月21日	⇒ 2023年12月21日	2023年10月3日	⇒ 2024年1月3日
2023年9月10日	⇒ 2023年12月10日	2023年9月22日	⇒ 2023年12月22日	2023年10月4日	⇒ 2024年1月4日
2023年9月11日	⇒ 2023年12月11日	2023年9月23日	⇒ 2023年12月23日	2023年10月5日	⇒ 2024年1月5日
2023年9月12日	⇒ 2023年12月12日	2023年9月24日	⇒ 2023年12月24日	2023年10月6日	⇒ 2024年1月6日

お問合せ先

川崎市新型コロナウイルスワクチン予約コールセンター

電話番号：  **0120-654-478** FAX 044-953-6339
※耳の不自由な方のお問合せ用

受付時間：8時30分から18時まで（土日祝日対応・12月29日～1月3日を除く）

- ・接種予約に関するお問合せ
- ・接種券に関するお問合せ
- ・接種証明書に関するお問合せ
- ・新型コロナワクチン接種に関するご相談
- ・接種後の副反応に関するご相談
- など

＜生後6か月～4歳のお子様の保護者の方へ＞
新型コロナワクチン予防接種についての説明書
(乳幼児(生後6か月～4歳)追加接種(令和5年秋開始接種用))

新型コロナワクチンの接種対象となっている生後6か月～4歳のお子様の保護者の方へ

- ◎ ワクチン接種には、保護者の同意と立ち合いが必要です。
- ◎ 接種を希望する場合、予診票の署名欄に、保護者の氏名を記入してください。接種を希望されない場合には、署名欄には何も記載しないでください。予診票に保護者の署名がなければ、予防接種はできません。
- ◎ 疑問などがあれば、あらかじめ、国や市町村からの情報をご覧いただくか、かかりつけの医師などによくご相談いただき、接種のご判断をお願いします。

新型コロナワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは、ファイザー社製の乳幼児用オミクロン株対応 1 価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)です。新型コロナウィルス感染症の重症化予防を目的として接種します。

オミクロン株対応 2 価ワクチン(従来株/BA.1 又は BA.4-5)の臨床試験で中和抗体価の上昇や有効性が確認されたこと、非臨床試験からヒトでの免疫応答の予測が可能と確認されたことを踏まえ、非臨床試験における本ワクチンの追加接種により XBB.1.5 に対する中和抗体価の産生が認められたことから、有効性が期待できるとされています。

販売名	コナティ筋注 6 か月～4 歳用 (1 価: オミクロン株 XBB.1.5)
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	1 回(前回の接種が完了してから 3 か月以上が経過した後) ※筋肉内に接種
接種対象	初回(1～3 回目) 接種を完了した生後 6 か月以上 4 歳以下の方
接種量	1 回 0.2 mL を合計 1 回 ※接種する有効成分の量は 3 µg (12 歳以上の 10 分の 1)

- 本ワクチンは、前回までの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず接種が可能です。
- 本ワクチンの接種を受けても、発症等を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

(※1) 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も、平時の体温を鑑み発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

(うらへ続く)

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みを訴える、息苦しそうにしている、等の症状が見られる、又は食欲や活気がない等が続くようであれば、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足を動かさない、力が入らない等の症状が見られる、又は食欲や活気がない等が続くようであれば、速やかに医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナワクチン（ファイザー社製のオミクロン株対応 1 価ワクチン（生後 6 か月～ 4 歳用、XBB.1.5）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2（オミクロン株 XBB.1.5）のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ ラクストジナメラン（オミクロン株 XBB.1.5 のスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [(4 - ヒドロキシブチル) アザンジル] ビス (ヘキサン - 6 , 1 - ジイル) ビス (2 - ヘキシルデカン酸エステル) ◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [(ポリエチレングリコール) - 2000] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド ◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 精製白糖 ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

接種の予約に必要なあなたのログインID

--	--	--

川崎市 新型コロナウイルスワクチン接種券

当日の 持ち物	<ul style="list-style-type: none"> ●ワクチン接種券 シールを剥がさずに、接種場所へ台紙ごとお持ちください。 ●予診票 事前にご記入の上、ご持参ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
------------	---

接種券	診察したが接種できない場合																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">券種 2 (□ 予診のみ)</td> <td style="width: 33%;">7 回目</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>請求先 神奈川県川崎市</td> <td>141305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>券番号</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	券種 2 (□ 予診のみ)	7 回目		請求先 神奈川県川崎市	141305		券番号			氏名			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">券種 1 (■ 予診のみ)</td> <td style="width: 33%;">7 回目</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>請求先 神奈川県川崎市</td> <td>141305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>券番号</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	券種 1 (■ 予診のみ)	7 回目		請求先 神奈川県川崎市	141305		券番号			氏名			新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種) Certificate of Vaccination for COVID-19
券種 2 (□ 予診のみ)	7 回目																									
請求先 神奈川県川崎市	141305																									
券番号																										
氏名																										
券種 1 (■ 予診のみ)	7 回目																									
請求先 神奈川県川崎市	141305																									
券番号																										
氏名																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">7 回目</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>接種年月日</td> <td style="text-align: center;">メーカー/Lot No</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">(シール貼付け)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">日</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	7 回目			接種年月日	メーカー/Lot No		年	(シール貼付け)		月			日											
7 回目																										
接種年月日	メーカー/Lot No																									
年	(シール貼付け)																									
月																										
日																										

新型コロナウイルスワクチン接種記録

	接種年月日	メーカー
1 回目		
2 回目		
3 回目		
4 回目		
5 回目		
6 回目		

- ※予防接種台帳管理システム又はワクチン接種記録システム (VRS) に記載されている情報を基に作成しています。
- ※接種の記録が確認できないなどの場合は、「*」を表示しています。
- ※接種の予約をされる際には、前回の接種年月日からの接種間隔をご確認ください。

予防接種済証(臨時接種)は、予防接種法に基づく臨時接種として行われていることを示しています。臨時の接種済証という意味ではありませんので、接種が終わった後、予防接種済証(臨時接種)は大切に保管してください。

氏名	
住所	
生年月日	

